

**DE MOTU, ET
CIRCUITU
SANGUINIS
TRACTATUS...**

Giovanni Battista
Scaramucci






M

Ex Bibliotheca
- majori Coll. Rom.
Societ. Jesu

#57, 67
69
35
43
12
13
2
14





DE MOTV,
ET CIRCVITV SANGVINIS
TRACTATVS IATROPHISICVS
IOANNIS BAPTISTÆ
SCARAMVCCIÆ
MEDICI LAPIDONENSIS
ADVERSVS DISERTATIONEM
LOGICOEMPYRICAM
NVPER EDITAM
DE EODEM ARGVMENTO



*Apud Andream de Montibus. 1677.
D.D. Superiorum permissu.*

Illustrissimo Domino

D. ALEXANDRO ODOARDO

DE CATALINIS

PATRITIO ASCVLANO

IOANNES BAPTISTA

SCARAMVCCIA

LAPIDONENSIS

VOTA, ET OBSERVANTIAM.



*A est in animãtibus cor-
dis virtus, & digni-
tas, ut ad ipsum tan-
quam ad vitæ fontem
sanguis undique irre-
queto cursu anhelet, portum in
eiusdem sinubus inuenturus; non ut
segniter palustrium aquarum in mo-
dum stagnet, sed ut vitalium auctus
robore spirituum, ad uniuersi cor-
poris partes nutriendas alacrior, &*

robustior reuertatur Vides Illustris-
 sime Domine in ipso mei opusculi
 argumento expressam imaginem am-
 plitudinis tuae, tuorumque in me me-
 ritorum. Iresserunt multi, ut qua
 de sanguinis circuitu à Doctissimis
 huius aetatis Philosophis, ac Medicis
 accepissem, breui scripto comprehen-
 derem, opponeremque logicoempyri-
 ca disceptationi, quam isthic con-
 scripsit Nicolaus Orpheus Paulonius;
 Obtemperavi illis, si non ut debui,
 certè ut potui. Proinde quod ad Te
 meus hic liber aut veniat, aut reuer-
 tatur, nequaquam mirabere, didi-
 cit ab ipso sanguine iter suum, quem
 admodum Tu ipse à tuis maioribus,
 quam ad virtutem, & famam tene-
 res viam, didicisti. Nobilissima, &
 illustrissima ortus Odoarda gente,
 qua in suis numerat Catalinam illū
 Rom. Reipublica terrorem habuisti,
 quò

quò maximè gloriaberis ODOAR-
 DVM ODOARDVM Patrum tu-
 um Maiorem Auenione primum,
 deinceps Bononia XXIV. Annos
 Equitum Prefectum Religione, Li-
 beralitate, fortitudine, ac Prudentia
 laudatissimum, atque octo summis
 Pontificibus Carissimum Virum.
 Habuisti Patrum tuum BRVTVM
 pluribus bellicis muneribus egregiè
 perfunctum, aliosque qui Te decorũ
 suorum heredem fecerunt, ut in ci-
 uilis vitæ tranquillitate docta Palla-
 dis pacificas artes tuereris, quemad-
 modum illi armata pericula non for-
 midarunt. Eximijs hisce, licet dispa-
 ribus studijs clariorem in dies lucem
 maiores tui in Te deriuant, in eodẽ
 tu segeris. Illi tibi sanguinem gene-
 rosum suppeditarunt, ut vene cordi;
 Tu rursus in familiam, imò in Ciues,
 amicos, clientesque omnes eximia
 A 3 beni.

benignitate viridiorē sanguinem,
 ut cor in arterias ac membra diffun-
 dis. Meritò igitur liber hic meus se-
 se Tibi ex voto nuncupat, id à Te
 habiturus, quod sanguis à Corde:
 nimirum ut ex tuo sinu in studiofo-
 rum manus dignior veniat, ac illu-
 strior. Vale.



BENEVOLO LECTORI.



XIMIVM profectò beneficiū
Reipublicæ Philosophorū,
ac Medicorum contulit
Guilielmus Harueius, edi-
to de motū, & sanguinis
circuitū opusculo doctissimo. Miratus
est orbis litterarius inauditum dogma
tantā solertia excogitatum, firmisque
adeò rationibus a suo autore stabilitum
fuisse, ut quivis vel mediocriter atten-
tus, presertim si anatomicæ artis non
sit imperitus, possit eius veritatem suis
oculis, ac manibus vsurpare. Fecerunt
id prestantes Viri **VVALEVS, RIOLA-
NVS HOFMANNVS PEQVETVS CO-
RINGIVS SLEGELIVS BACK BRA-
VO BARTHOLINVS SILVIVS STE-
NO CHARLTONVS VVILLIS MO-
LINETTUS** aliq; complures huius æta-
tis Archiatri, quorum singuli accuratissi-
mis, ac novis experimentis Harueia-
nam doctrinam comprobarunt, suisq;

A 4 in

inuentis ita amplificarunt vt iam nemo ferè fit inter Philosophos, ac Medicos, qui circuitum sanguinis vt rem penitus exploratam non amplectatur.

Nichilominus à Nicolao Orpheo Paulonio dissertatio logicoempyrica in lucem ita fuit, qua credidit probare, haud sanguinem cieri in orbem, prolatumque ab eo fuit, à Recētioribus Hipp. & Gal. dicta perperam accipi, pro re absurdissima, reiue Medicæ apprimè perniciofa; Sic. n. honorarius iste iudex arrepta censoria virgula de circuitu sanguinis pronunciat. Verum ipse vnum solum fortasse legerat Romanum Archiatrum, cuius manuscriptum Libellum, vt conicere est refutandum suscepit. Licet aũ argumenta pro sententia, quam tuemur, neq; omnia neq; robustè proferat, mirabiles sunt responſiones, quas eis adornat Acutissimus iste Iuuenis, qui nuper à clamoribus philosophicis digressus ea principia medullitus retinet, (vt ipse met fatetur).

Venio nunc ad autoritatem maiorũ, quorum assertis non probari sanguinis

Cir-

circuitum putat Paulonius. Aristoteles lib. de somno, & vigilia cap. 3. hec habet verba. Non omnis impotentia sentiendi somnus est. sed ea solum, quam diuaporatio alimenti committit; quod. n. rarefactum est quadamtesnus attolli, deinde regredi, & refruere instar Euripi necesse est; nam animatis cuiusque calidum in sublime natura fertur ac vbi eo loci subuectum e, mox vniuersum reciprocatur, ac descendit. Gal. lib. de vsu partium cap. 10. scriptum reliquit. In toto est mutua anastomasis, atque osculorum apertio arterijs simul cum venis, transsumuntq; ex se pariter sanguinem, & spiritum, per inuisibiles quasdam, & angustas plane vias. &c. & cap. 11. Communis autem ipsorum omnium videlicet valvularum e vsus, vt materias retro remigrare prohibeant, vtrarumq; verò proprius educentium quidem e corde materias, ne amplius ad ipsũ rement, inducentium verò ne amplius ex ipso effluant. Non. n. volebat natura vno labore Cor fatigari, neque in eam partem mittere, vnde retrahere praestiterat, neque rursus ex illa identidem ducere, ad quam

mittere erat necesse. Proinde cum sint quatuor orificia bina in utroque Ventriculo, alterum quidem inducit, alterum verò educit. Et paulo post eodem cap. Porro cum Vas alterum quod tunica simplici constat in Cor infigatur, alterum quod duplici ex ipso producat, communem utrique locum, quasi lacunum quamdam parari necesse fuit, ad quam pertinentibus utrisque per alterum quidem trahatur sanguis, per reliquum emittatur.

H p lib de off. nat. hæc scribit. Vena per corpus diffuse spiritum, & fluxum, ac motum exhibent ab una multa germinantes; atque hæc una undè oriatur, & ubi desinat non scio, circulo-n, facto principium non inuenitur. Et lib. de alim. Principium aut omnium unum est, & finis omnium unus, & idem finis est, atq; principium, & inferius hæc subdit. In pilos alimentum, & in ungues, & in extremam superficiem intrinsecus pervenit, forinsecus alimentum ex extrema superficie ad intima pervenit. Confluxio una conspiratio una consentientia omnia. Et eodem libr. Radicatio venarum hepar, radicatio arteriarum Cor, ex

his

his aberrat in omnia sanguis; & lb. de nat. hum. crassa vena sibi mutuò alimentum subministrant internæ externis, vicissimq; externa internis.

Itaque rem ipsam tradit Hipp!, modum subdit Gal., eorumque effata de sanguine in omnia aberrante, ac de venis arterijsque ex se sanguinem transluentibus, prima lineamenta sunt doctrinæ Recentiorum de sanguinis circuitu: aut ergo veterum dogma de motu eiusdem ac de transitu ex arterijs in venas reprobandum est, vt absurdissimum ac Medicinæ perniciosum; Vel Recentiores non modò scelleris puri censendi sunt, quod non contradicant Hip. & Gal., sed preterea immensis laudibus extollendi, quod ab eis inchoata, & adumbrata prouehant, ac perficiant.

Verum estò recens anatomia in hac parte refragaretur Hip., & Gal. quam graue id putas piaculum fore? Num liquerit veteribus à veritate deficere, nobis vero nefas fuerit à veterum opinionibus dissentire?, & ijs assentire duntaxat contenti erimus.

QVE LONGA VETVSTAS,
OCCVLIT ARCANIS ORACVLA
MERSA TENEBRIS.

Eum qui ita iudicet, non veterum discipulum, sed mancipium existimarem; liberi atque ingenui ingenij è in questionibus merè naturalibus, non à quibus, sed quæ dicuntur attendere: neq; n. veritas è conformitas cognitionis nostræ cum veterum cognitione, sed cum obiectis, vt falsò credunt multi, qui asserunt recedere ab antiquitate, è recedere à veritate. Decipi nos possumus, decipi antiqui potuerunt. Eorum erratis libenter ignoscimus, vt nostris quoque ignoscatur. Confido tñ. haud paulo verisimiliora in hoc nostro, quam in Aduersarij opusculo à te inuentum iri Amice Lector. Vehementer obsecro te, atque obtestor, vt hæc perlegas eo animo, quo à me conscripta sunt, candido scilicet veritatiq; ac rationibus multum, nudè autem auctoritati parcius addicto. Vt clariori tñ. methodo procedam in refellenda

lenda Aduersarij dissertatione, prius demonstrabo certissima sensuum fide, & magistra rerum experientia comprobari sanguinis motum in orbem.



OPVS cui Titulus est, *De Motu, & Circuitu Sanguinis Tractatus Iatrophisicus* à D. 10: Baptista Scaramuccia Medico Lapidonenſi conſcriptum, Juſſu Reuerendiſs. P. Inq; Gen. Firmi legi, ac pari vòluptate, ſedulitateq; perlegi, & cum in eo nihil contra bonos mores, ac ſummorum Pontificum decreta repperim, miratuſq; ſim claritatem dicendi, confutandi ſagacitatem, methodum diſſerendi, vbertatemq; ingenij in ſoliditate doctrinæ oſtenſam dignum cenſeo vt typis mandetur.

*Ego Dominicus Pierius Medicinæ Præſtiq;
in noſtro Firmano Gimnaſio Lector Ord.*

Imprimatur.

Fr. Seraſinus Leonius Inq; Gen. Firmi.

Imprimatur.


In. Antonius Gratianus Arch. & Depat.
pro Illuſtriſs. & Reuerendiſs. Archiepiſ.

PARS

PARS PRIMA

TRACTATUS IATROPHISICI

DE SANGVINIS MOTV.



VPLICEM in aquis circuitum, quantum ad rem nostram at-
tinet Philosophi obseruant ;
Nam & vapores virtute caloris ex aqua, locisque humentibus sursum eleuati, vbi peruenerint ad mediam regionem aeris, & ab eius frigore in aquas mutati fuerint depluunt in terram, eiusque natium siccitatem, & adfcititium calorem temperant : Et aqua maris per occultos meatus à terra ebibita in
varios

varios fontes, ac fluuios erumpit; qui aquam ex oceani visceribus haustam ad eundem reuehunt, ac remittunt.

Simile quippiam contingit in homine, qui parvus è mundus, sed maiori longe admirabilior; Et quidam prioris circuitus exemplar habemus in corde, ex quo propter eius eximium calorem eleuantur successiue partes sanguinis subtiliores, hæ conuersæ vt censet MOLINETTVS in spiritus vitales, per arterias carotidas feruntur in parenchyma cerebri rarum, & molle; cuius etiã frigore pars predicti sanguinis
& spi-

& spirituum conuersa in purâ,
 & limpidissimam aquam sen-
 sim delabitur in cerebri ven-
 triculos, ex quibus per infundi-
 bulum in glandem pituitariâ,
 ex hac per ductus peculiare
 (anatomici recentes Sympha-
 ticos vocant) descendit in ve-
 nas iugulares, & cordi restitui-
 tur, ex quo inanauerat; pars
 eaq; purissima, vt placet Do-
 ctissimo VVILLIO in medul-
 læ truncum se insinuat, atq; in
 spiritus animales mutata ner-
 uis communicatur. En sangui-
 nis circuitum ex Corde in ce-
 rebrum, per quem iugiter mu-
 tatur sanguis in aquâ, & aqua
 in

in sanguinem; ille defertur per carotidas arterias, ista refertur per venas iugulares. Hac a^m. ratione Cor suppeditat moderatum calorem cerebro; Cerebrum verò nimium cordis estū temperat, ac refrigerat.

Alterius circuitus exemplū non solum desumitur ex motū lympharum (loquimur de lymphis alterius generis à nuper memoratis, quæ in tertia coctione separantur, cumque nequeant conuerti in substantiam alicui, per peculiare ductus, qui lymphatici à recentioribus nuncupatur, inuento-
re BARTHOLINO ad Cor
reue-

reuehuntur) sed precipuè ex motu sanguinis; hic. n. ex corde influit in magnam arteriã, quæ in humano corpore instar gerit Oceani, ex magnæ autẽ arteriæ mari, venæ, quæ similis videntur fluuijs, hauriunt sanguinem, eumq; remittunt per cauam ad cor. Hoc est misterium circulationis sanguinis ab HARVEIO luculenter demonstratæ, in qua nihil non redolet solertissimam sapientiam Diuini Artificijs, qui hominem mundo analogon fabricauit.

Possem pluribus hanc analogiam inter Megacosmam, & Mi-

Microcosmum prosequi: Verum preter quam quod in hoc opusculo non Rhetorem, sed Philosophum agere decreui ad conciliandos huic sententiæ, quæ doctis quibusque hodie arridet, lectorum animos, eam satis est indicasse.

Antequam tamen de ipso sanguinis circuitu disputare incipiam, nonnulla de corde, eiusque motu breuiter esse premittenda fui ratus. Vnde sit.

CAPVT PRIMVM
DE MOTV CORDIS,
ET ARTERIARVM.

Quanta sit in Cordis physiologica cognitione diffi-

difficultas , inde manifestum
 euadit , quod quot capita tot
 sententiæ ; Et quamuis MO-
 MVS fenestram in humano
 corpore à IOVE postulauerit,
 per quam, & cor, & quod in eo
 lateret conspici posset, tñ. 1010
apertopectore ait Celeb. IACOB
 de BACK *ipsoque corde viso reni-*
soque toties, tam uiuo, quam emor-
tuo sed vlis, atque accuratis doctis-
simorum virorum exercitationibus,
observationibus adhibitis, de reum
nihilominus è ante nostra secula, &
in hoc usque euũ, neque adhuc de il-
lius motu causa, & effectu, & usu iter
viros graues & illustres conuenit.

Irafcibilitatis sedem in Cor-
 de residere à PLATONE sta-



bilitur.

bilitur . Ab ARISTOTELE
 vegetantis, sentientis, & ratio-
 cinantis animæ facultatem. A
 ZENONE hîc diuinû & cœ-
 lestem calorem contineri, quē
 Prometheus è Cœlo Pœtę de-
 prompsisse fingunt. GALE-
 NVS, & HIP! determinant fō-
 tem esse, & officinam vitalis
 spiritus. HARVEIVS ratus est
 Cor esse quidem fontem, &
 originem, primamq; vitæ cau-
 sam, solem microcosmi, cau-
 sam perfectionis sanguinis,
 autorem omnium, & vitæ fun-
 damentum, si simul sumantur
 arteriæ venæ, & sanguis con-
 tentus, vti pro adequato sen-
 sus

sus organo intelligitur cerebrum cum omnibus nervis sensorijs, organis, & spinali medulla. Cor fontem & officinam non esse spirituum sensit cum **ARNOLDO DE REECK**, **IACOBVS DE BACK** cum hi in corpore humano non reperiuntur, sed solum per accides corpori calorem communicare, & precipuum esse propellendi instrumentum, unde solum distribuendi commoditatem habere affirmat. **CORRINGIVS**, & **PEQVETVS** cum **ARISTOTELE** determinant sanguinis officinam electricam cor esse. **VVALÆVS** & **BARTHO-**

THOLINVS fontem esse caloris, & spirituum, & perfectionis sanguinis defendunt. Cor tandem principium esse omnium partium, & officinā illius caloris, quō animal viuit sentit MOLINETTVS, in eo-que chilum cum sanguine cōmisceri vnāque corpus integrare per repetitas ambages viarum affirmat. Hinc patet cieri cor certum esse, letigiosū verò à qua causa id fiat. Probabiliorem tamen in hac dissertatione adducam sententiam, eamq; à Recentiorum placitis deductam.

Motus cordis constat Dia-
stole

stole Systole, & Perisystole.

Diaстole motus est accidentalis cordis, & est eiusdem cordis dilatatio, qua dexter ventriculus impletur sanguine, & sinistro impletur illo ab arteria venosa demandato.

Systoles motus est proprius cordis, & est contractio, & re-ctio quædam eiusdem in angustum, ut sanguis è dextro cordis ventriculo in venam arteriosam effundatur, & ex sinistro in arteriam aortam.

Perisystole verò est quies quedam, & morula inter utrūque motum.

B

Num

Num autem is motus, quē nos vocamus Systolem sit Diastole, & is quem vocamus Diastolē sit Systole, ut vult HARVEIUS, hoc parum refert. Certum enim est in Diastole impleri, in Systole exinaniri.

Causa efficiens motus cordis duplex institui potest, proxima nempe, & remota; pro remota possunt assignari spiritus tum insiti, tum influentes, cordis conformatio, & vasorū, pulsio, attractio &c. Pro proxima Recentiores cum BARTHOLINO duplicē assignāt, Sanguinem nimirum, & facultatem pulsificam.

Sanguis

Sanguis igitur purus influens,
 per venam cauam, & arteriam
 venosam, talisque permanens
 instar aquæ in utræ Cor in tu-
 morem agit, & quia maxima
 sui parte distenditur, & mole-
 sta est copia, ideò ad eam ex-
 pellendâ collectis fibris insur-
 git, Et sicuti rotæ molendina-
 riæ, vt ait BARTHOLINVS
 perpetuo aquarû insultû agi-
 tate mouentur, quo cessante
 cessant, ita etiam, & à sangui-
 nis impulsu continuo moue-
 tur Cor, quo impulsu cessante,
 cessat etiam motus cordis.

Copia autem debet esse suffi-
 ciens, vt distendat, vnde con-

B 2 tinuò

tinuò celeriter, & vehementer
ad Cor pellitur sâguis ab vtra-
que vena caua, tum ascenden-
te, tum descendente de man-
datus, vt volunt HARVÆIVS
VVALÆVS, & BARTHO-
LINVS; hocque experimento
id confirmant, quod si vincu-
lo intercipientur vasa cordis
adferentia, motus cordis desi-
nit, reliquus erit vndulans, &
quasi palpitatio; Soluta verò
ligatura motum recipit.

Ex quo colligitur falsâ esse
sententiam ARISTOTELIS,
affirmantis (quem sequi fue-
runt CREMONIVS HOF-
MANNVS, & alij) causam
disten-

distentionis non esse sanguinē purum, sed ebullientem instar aquæ, quæ feruet, & ebullit in igne; nam ebullitio nulla per se æqualis, & consequenter nunquam æqualis obseruaretur pulsus, & quo maior esset ebullitio, maior obseruaretur pulsus; quod falsum, cum in febribus ardentibus pulsus sit exilis, licet ob æstuantem calorem maxima sit efferuescentia.

Neque ob rarefactionē guttæ sanguinis, vt volunt REGIVS, & HOGELANDIVS, cum preter rationes de ebullitione supradictas, in tantam molem gutta non possit rare-

B ; fieri.

fieri, vt motus cordis causa fit;
 Preter qm̃ quod in viuīs ſe-
 ctionibus purus effluit qualem
 auricula demilerat; imò vt af-
 firmat IACOBVS de BACK
 caro cordis muſculofa firmior,
 & validior; nequit inflari, &
 detuneſcere à nuda ſanguinis
 rarefactione.

II. Facultas pulſifica, Cordi in-
 ſita, neceſſariò cum ſanguine
 eſt coniungenda, vt moueatur
 cor, ſiue vt per ſe producat
 motum in ſententia Antiquo-
 rum, qui conſeruari non po-
 teſt, ſi ſanguinis perpetuus flu-
 xus inhibeatur; ſiue eiufdem
 ſanguinis influxum, & exitum
 dirigat

dirigat ordinatum ; alioquin
 pulsus esset inæqualis ; quia
 inæqualis esset influxus , nisi à
 facultate dirigeretur . Vnde
 utramque causam , ut primariā
 coniungendam arbitror ; Nam
 in febribus in quibus vehemē-
 tius mouetur sanguis ob calo-
 ris æstuationem , imbecillior
 cordis observatur motus , ut ex
 pulsū colligitur , quia facultas
 insita est labefacta ; In cor-
 poribus verò sanis licet facul-
 tas valida sit , tamen aliquando
 deficit motus , si impediatur
 sanguinis influxus post hęc mo-
 rargias , siue ab obstructioni-
 bus valorum talem influxum

impedientibus; Imò sepius obseruavi in affectibus Asthmaticis, & Catharralibus pulsus aliquando esse intermittentes, & inæquales nulla præexistente febre; id autem non à facultate, sed ab intercepto influxu sanguinis à materia catharrali, siue serosa colluie in pulmonibus impacta accidisse crediderim.

Quare hic excludendus REGIVS, qui loco facultatis insitæ influxum spirituum animalium ponit in fibras, nam motus cordis est naturalis, & licet anima ipsi animali natura sit, tamen naturalis dicitur, quia à facultate

tate naturali animæ, quæ voluntaria non est prouenit, ut dicit LAVRENTIVS.

De arteriarum pulsatione, quod attinet, eam GALENVS fieri à sola facultate, eaque cōmunicata arterijs à corde tali pacto, & experimēto comprobabat. Intrusa arterijs cannula, & arteria supra cannulam ligata, ultra ligaturā arteria non pulsabat, & si per cannulam sanguis pelli possit, quod refert etiam Vesallius. Verum HARVEIVS affirmat referri hoc siquidē à VESALIO GALENVVM sectante, non autem comprobari id à se, neque à GALENO

B fuisse

fuisse experientia deprehensū;
 licet enim omni diligentia ad-
 ministraretur id, quod iuber
 GALENVS attamen re ipsa
 non succedere ipse expertus est
 HARVEIUS propter sangui-
 nis hæmorrhagiam. Hinc ipse
 à solo impulsu sanguinis origi-
 nem motum articularum ex eo com-
 probat, quod in Aneurismate,
 in qua tunica arteriæ deest,
 persentitur pulsus, & caro di-
 latatione trahere sanguinē ne-
 queat, vt confirmant VVA-
 LÆVS, & RIOLANVS; Quia
 tamen statutum est causā pro-
 ximam motus cordis esse, tum
 facultatem, tum sanguinis im-
 pulsū, & pulsū,

pulsum, ideò & ab impulsu sanguinis, & à facultate dirigente fieri motum arteriarum cum Vvalœo, & Bartholino sentio.

Verum facultatem hanc nō esse à corde communicatam ut volunt hi, sed insitam cum

BR AVO existimo, qui ad id comprobādū hec habet verba.

Si a corde communicaretur facultas pulsifica, vel eadem est numero, & implicat, quia nequit accidens migrare de subiecto in subiectum, cum ab illo indiuictetur; vel per continuū alterationem, & hoc implicat, quia vitalis facultas, cum sit propria passio animæ, ut anima est, non potest produci ab eo, quod non est anima.

Imo adderem dum cor di-

B 6 latatur

latatur arterias constringi vti probabo; vnde sequitur, quod cum cor V. G. constringatur, & consequenter sit in statu contrario dilatationi, nequeat dilatantem facultatem arterijs communicare.

Cum igitur portio sanguinis in cordis systole ad arterias transmittatur, colligo, vt cum ERISTRATO sentit AVICENNA, & cum his HARVEIUS, VALÆVUS, BARTHOLINVS, BACK, BRAVO diuersum esse motum cordis, & arteriarum. Dum. n. cor constringitur, arteriæ dilatantur, & dum cor, dilatatur arteriæ

riæ

riæ constringuntur, quid quid
dicat VALLESIVS, & alij cū
GALENO; nam cum cor, dum
comprimitur, emittat sangui-
nem, & spiritus in arterias, si
comprimerentur arteriæ, ne-
quirent recipere à corde, quod
mittit, & si eodem tempore di-
latarentur arteriæ, & cor, simul
atraheret cor ab arterijs, & ar-
teriæ à corde. Imò quia in cor-
dis dilatatione clauduntur va-
luulæ, impediētes sanguinis
recursū ab aorta ad ipsum cor,
& deinde quia cōprimitur ar-
teria, & nequeat recipere, nū-
quam esset apta ad recipiendū;
etiamsi totalis nō esset obstru-
ctio,

Etio, ut vult VALLESIVS.
Vndè patet arterias impleri, ut
vires, & non ut folles, dilatâ-
tur nimirum quia implentur,
non verò implentur, quia di-
latantur.

CAPVT SECVNDVM IN QVO CONSISTAT FORMALITAS CIRCVLATIONIS.

Effectricem sanguinis of-
ficinam esse hepar cõ-
munis fuit opinio, tale añ mul-
tus cordi deberi sentiunt cum
ARISTOTELE CORINGI-
VS, PEQVETVS, variique re-
centiores, Igitur siue in hepate
generetur ex Antiquorũ dog-
mate

mate, siue in corde ex Recen-
 tiorum doctrina, certum est
 sanguinem siue de nouo geni-
 tum, siue nutritioni superflu-
 um, & refluxum ob crassitiem,
 & ob deficientiam caloris vi-
 talis ineptum reddi ad nutri-
 tionem nisi vltiorem elabo-
 rationem, & perfectionem re-
 ciperet in Corde; hinc proui-
 da natura voluit consultum, vt
 per successiuum circuitum per
 Cor vltius perficeretur, & ad
 assimilationem aptior redde-
 retur; Eius aũ motus talis est;
 Tum sanguis ab hepate in ve-
 nam cauam transmissus, (siue
 in corde generetur, & hepar
 de-

demittatur pro bilis segregatione, siue in eodem hepate conficiatur), tum sanguis nutritioni superfluous, & in eadem venam cauam refluxus, per eadem venam cauam in dextrum cordis ventriculum defertur, hinc per venam arteriosam ad pulmones transmittitur, à quibus per arteriam venosam in sinistrum cordis ventriculum deducitur; tandem per arteriam aortam, siue magnam in arterias maiores, tam ascendentes, quam descendentes deportatur, & ita distribuitur, ut à maioribus ad medias, à medijs ad minimas, ab his per anastomoses, venas

venas minimas ingrediatur, à minimis verò venis transfertur ad medias, à medijs ad maiores à maioribus tandem ad hepar, & ad eandem venam cauam, à qua iterum ad dextrũ cordis ventriculum, & sic successiue fit motus iste circularis.

Prius tamen quã talis sãguinis via ratione, & experiẽtia cõprobetur, A' priori esse demonstrandam fui ratus. Vndè sit.

CAPVT TERTIVM

A' PRIORI PROBATVR SANGVINIS CIRCVITVS.

CVM impossibile sit, vt motus cordis orriri queat a gutta sanguinis rarefcente,
vel

velebulliente, velin spiritum
se conueſcente, conſideranda
copia, qua cteatur cor, vt cla-
rius comprobata veniat ſan-
guinis circulatio.

Fautores ſanguinis circui-
tus, vt HARVEIVS VVA-
LÆVS CORINGIVS SLE-
GELIVS, BARTHOLINVS
PEQVETVS BRAVO BA-
CK &c. per vncias, dragmas,
ſcrupulos eius quantitatē me-
tiuntur.

HARVEIVS in diaſtole
cordis vltra vncias duas inue-
nit, PLEMPEIVS ferè vncias
duas, RIOLANVS vnciam ſe-
mis concedit, HOGELAN-
DIVS

DIVSetiā vnciam semis in sy-
stole supponit, HARVEIVS
dragmas duas in homine,
BRAVO vnciam semis, CO-
RINGIVS, & VVALÆVS
singunt scrupulum vnum, Ho-
gelandius dragmam vnam, Bar-
tholinus scrupulum semis sup-
ponit.

Considerandum insuper est,
quot pulsationes vna hora pe-
ragantur, multi multa dicunt,
cum varient pro cuiusque eta-
te, tempore, & diæta.

Sumamus igitur numerū
à BARTHOLINO conscri-
ptum, qui est 4400., & ponat-
mus in vnica pulsatione scru-
pulum

pulum semis sanguinis emanare , manifestè observabimus vna hora cum fiant 4400. pulsationes, 4400. semiscrupulos sanguinis expelli à corde , qui nummerant libras septem uncias septem, dragam semis. Cū igitur in homine ad summum admittantur libræ sanguinis 24., & hæ transeant per cor ad summum spatio trium horarū, sequitur manifestè , eundem sanguinem, qui semel transiit per cor , iterum ab arterijs in venas, à venis ad cor suppeditari, cum tanta quantitas ab assumptis non possit emanare, & longe maior sit , quam
par-

partium nutritioni conueniat.

CAPVT QVARTVM DE VALVVLIS, TVM CORDIS, TVM VENARVM.

CVM valuulæ sint impedimento, nè violentia remeet sanguis per eâdem viâ, per quam influxerat, de ijs hic esse differendum fui ratus.

Ex structura igitur cordis vasorû satis comprobatur cieri sanguinem à vena caua ad dextrum cordis ventriculû, à dextro ventriculo in venam arteriosâ, ex vena arteriosa ad arteriam venosam, ab hac ad sinistrum cordis ventriculum, nunc per aortam, & simul confirmatur

firmatur in his, non posse dari sanguinis recursum, Prouida namque natura venæ cauæ prope cor valuulas construxit foris intrò spectantes ianitrices dictas, quæ & tricuspites vocantur, cum sint similes cuspidibus triangularibus telorum; constant autem quadam membracula, admittuntq; ingressum, sed non regressum.

Væna arterialis tres etiam ipsa habet valuulas intus foras spectantes, sigmoides à grecis dictas, cū semicirculū referant, ad eundē finē pariter cōstructæ.

Arteria venosâ duas possidet valuulas foris intrò vergentes, quæ

quæ quia mitram episcopalem referunt, mitrales dicuntur, ad eundem etiam usum.

Tandem arteria magna siue aorta tres, & ipsa habet valvulas intùs foràs spectantes, pariter sigmoides dictas, quæ constructæ sunt, nè sanguis ab arterijs in cor remearet. Quarum valvularum usum non tantum à Recentioribus, sed & ipsi Galeno cognitum fuisse deprehendo, ut videre est in prefatione ad lectorem.

Venis quoque valvulas fuisse à natura concessas, ad impediendam pariter sanguinis retrocessionem omnes concedunt.

Re-

Recentiores, autopsia ipsa demonstrante, de quibus mentionem, factam fuisse ab Auienna sub nomine cellularum scribit Bauhinus, quam quam se inuentorem predicet. Aqua pendens, cui tamen indicia de illis dedisse Paulum Seruetum Venetum notat Bartholinus.

Valuulae igitur in venis sunt tenuissimae membranulae, (crassae verò quae in corde) in earum interna cavitare, à quadam portiuncula tunicae venarum ortae.

Sitae sunt in venis potissimum arctuum; brachiorum nimirum, & crurum, post alarum, & inguinum glandulas; Reperiuntur

tur etiam in orificio venæ iugularis internæ binæ supernè deorsum spectantes ; reliquæ verò sursū spectant in cæphalica, in basilica, in venis pedū, & crurum. In vena caua non habentur valuulæ, quum enim in diuarcationibus magna copia sanguinis, per eas reuertatur ad cor recursum ipsum liberum impedirent, & sanguis in trunco nimiam moram traheret.

In iugularibus præter modò dictas in orificio, aliæ non reperiuntur cum difficulter possit sursū regredi sanguis sua sponte grauis; In orificio enim ideò

C con-

construxit eas natura nè reclinato capite ad cerebrum sanguis recurreret, & sic ut ait Bartholinus operationes animales derurbaret, & Apoplexiam sanguineam generaret.

Neque enim in venis exiguis externis reperiuntur valuulæ, cum in illis regredi sanguis non possit ob vicinitatem arteriarum sanguinem pellentium.

In emulgentibus, & ramis mesentericis valuulas inuenisse testantur Harueius, & Bartholinus, versus venam cavam, & portam spectantes.

Situs, & numerus variant pro diversitate temperamenti.
& con-

& constitutionis corporis .

Vſus harum idem eſt per Harueium Vvalæum , & Bartholinum alioſque recētiores , ac illarum , quæ ſunt in Corde , neque verum valvularum vſū ſimile aſſequutum inuentorem (teſtatur Harueius) dicentem nimirum valvulas fuiſſe conſtructas , nè pondere ſanguis deorſum ad inferiora ſubito rueret ; num in venis iugularibus deorſum ſpectant , & ſanguinis ſuſum ferri prohibent . In arterijs nullæ obſervantur valvulæ , niſi propè cor cū nulla ſit earum neceſſitas , in his .n. debet ſemper fieri ſan-

C 2

guinis

guinis spirituosus fluxus, neque
 vlla necessitas est huiusmodi
 refluxus, vt ait Bartholinus;
 Preter quam quod à cordis ac-
 tione vno impetù eleuantur, &
 à cessante contrahuntur, & cō-
 cidunt; neque est metus com-
 pressionis aliarum partium, vt
 in vænīs, propter substantiæ
 arteriarum duritiem, vt dicit
 Iacobus de Back.

Iam quādoquidem memi-
 nimus valuularum, profiteor
 vidisse me Romæ irritō cona-
 tu immissum siphonem plenū
 atramento in venam brachij
 cuiusdam cadaueris, ex quo
 brachio totus sanguis fuerat
 edu-

eductus, Porro vena nè guttā
quidem atramenti admisit in-
miso autem siphone in arte-
riam, atramentum adeò arte-
rias impleuit vt tamen fieri etiā
venæ conspiciebantur, & vna
venarum secta instar sangui-
nis atramentum emicauit; Ex
hoc experimento, quod me
ipresente cum ceteris peractum
à Doctissimo Anatomico S.
Spiritus Bernardino Genga
duo colligas, videlicet dari va-
luulas, earūque vsum esse san-
guini ex arterijs in venas aditū
aperire, obstruere autem, ne
ex venis in arterias reuertatur.

CAPVT QVINTVM

DE VIA PER QVAM MOVETVR SANGVIS IN CORDE.

Sanguinem vti diximus
cap 2. deferri à vena
caua ad dextrum cordis ventri-
culum, indè ad pulmones per
venam arteriosam, à qua per
arteriam venosam ad sinistrũ
cordis ventriculum, & hinc
demum per aortam, ita proba-
tur. Ligata vinculo vena caua
non multum à corde remota
intumescit ea pars citra ligatu-
ram, non quæ cor respicit, sed
quæ distat à corde, g signum
est, non à corde sed ad cor san-
guinem

guinem proficisci.

Inductione hoc confirmatur ; Sit enim fluuius ortus ex montibus , & aquam deferens ad mare , in medio autem fluuij per transfuersum ab vno nimirū latere ad aliud latus existat aliquod impedimētum lignorum ita vt ab eo superetur aqua , quis non obseruabit ob tale impedimentum intumescere aquam cis impedimentū in ea parte , quæ montes respicit? hoc experimentum est euidentissimum .

Alia ratione non minoris momenti confirmatur sanguinem deferri per venam cauiam

ad cor. Si ligata vena, vt superius dixi, partem illam secaueris, quæ cor respicit, non nisi aliqua gutta sanguinis in eadẽ substantia venæ existens emanabit; Vnde constat non à corde prouenire sanguinem, si verò secaueris partem, quæ à corde è remota in magna copia emanabit, vnde colliges, sanguinem in venis non a corde, sed ad cor deferri.

A' corde autem deferri ad pulmones per venam arteriosam eodẽ modo probatur. Ligata vena arteriosa partẽ cordi propinquiorem tumidam obseruabis, inanitam verò, quæ

cis impedimentum pulmones
respicit.

Neque dubiū de tali motū,
etiam si admittatur cum Bar-
tholino aliquā sanguinis por-
tionem deferri à dextro in si-
nistrum cordis ventriculū,
per septum mediū, nam pre-
terquam quod talis transitus
negetur etiam in minima quā-
titate à Vvalæo, Har., Brauo, &
alijs, tñ talē portionē solū suf-
ficere ad generationem spiri-
tuum vitalium (vt etiam sen-
tiunt Gal. Bahuus, & alij), &
non impedire motum per ve-
nam arteriosam, iam explica-
tum affirmat idē Bartholinus.

C S Per

Per arteriam autem venosā
transmitti sanguinem ad fini-
strum cordis ventriculum, &
ab hoc per arteriam aortam,
eodem modo arguitur. Ligata
arteria venosa propè cor, in-
tumesceat ea pars, quæ pulmoni-
bus est propinquior, & si pars
hæc scalpello secetur in copia
emittitur sanguis, secus verò
quæ respicit cor; Et si ligetur
arteria aorta intumescit pars
cordi propinquior, & secta
emittet sanguinem, contrariū
in alia parte accidit. g. manife-
stum est sanguinem deferri per
arteriam venosā ad finistrū
cordis ventriculum, & ab hoc
per

per arteriam aortam. videatur
Bartholini tab. 4. fig. 1.

CAPVT SEXTVM

Sanguinis missione, & alijs rationibus
probatnr Sanguinis motum esse
ab arterijs ad venas minimas per
Anastomofim, & à minimis ad
maiores, & consequenter
Circuire.

Prob. 1. **S**anguis mouetur
in venis à circū-
ferentia ad centrum: g. datur
sanguinis circulatio. Cōsequē-
ntia probatur. Intantum mo-
uetur sanguis in venis à circū-
ferentia ad centrum; in quan-
tum suppeditatur ab arterijs,
sed in hoc consistit formalitas
circulationis, g. datur; ab alia
namq;

namq; parte non potest suppe-
ditari, vt dictum, & dicetur.

2 Antecedens primū pro-
batur. Si in venis non deporta-
retur sanguis à circumferentia
ad centrum, nimirum à manu
versus thoracem, in venæ se-
ctione, facta ligatura, non ap-
pateret tumida ea pars quæ
manum respicit, neq; ex illa
parte secta vena emitteretur,
sanguis: Sed tumida apparet,
& sanguis in copia emittitur:
g. à circumferentia ad centrū
mouetur sanguis in venis.

3 Si venam comprimās cis
foramen versus manum, dum
sanguis emanat, eius exitus im-
peditur

peditur : g. signum est, sanguinem ex ea parte venire versus foramen : Quod cognoscens quidam Chirurgus, ut sisteret sanguinem emanantem è vulnere propè cubitum inflicto, arctissime brachium ligauit ; verum ob nimiam copiam sanguinis, ita intumuit brachium, ut suffocato calore breui temporis spatio in eo stacelum ortum fuerit, quare ipsius brachij aputatio fuit opportunissima.

4 Sine vlla sectione vnusquisque in se ipso talem motum potest experiri, si conspicuas admodum habeat venas brachij. Si enim digito venam comprimente

mente sanguinem versus manum adigas, videbis venam inanitam, quæ ita permanente si altero digito velis ad venam inanitam sanguinem cogere, observabis adhuc venam inanitam, & partem venæ, quæ digito cogis tumidam, & quæ-
tò maiori conatù id feceris, tã-
tò clariùs valuulas ipsas instar
nodorum conspicias, quæ de-
scensum remoratum, & nihil
delabi permittunt. g. signum
è, à manu ad thoracem in bra-
chio sanguinem delabi.

§. Maior casualis secundi
argumenti probatur, nam cum
in venæ sectione aliquando ad
libras

dibras emittatur sanguis, ac ne-
 queat contineri in inferiori
 parte venarum brachij, neque
 in manu generetur, necesse est
 ut per arterias in venas sit de-
 missus; Si enim nimis arctè li-
 getur brachium, secta vena, ne
 gutta quidem sanguinis ema-
 nat, soluta ligatura aliquantu-
 lum in magna copia extrahi-
 tur, quod aliundè non venire
 arbitror, nisi quia compressa
 quoq; arteria, non suppedite-
 tut sanguis, & qui citra ligatu-
 ram versus manum existit in
 venis, ratione vacui non erū-
 pat: g in tantum cietur sanguis
 à circumferentia ad centrum,
 in

in quantum suppeditatur ab arterijs.

6 Si in niuem vel aquam frigidissimā immergantur pedes, vel brachium, & vinculo constringantur, ac detineantur in ea donec frigescant soluta ligatura, Statim cor refrigerari quisquis sentiet, g. datur sanguinis circulatio.

7 Si non daretur sanguinis circulatio serum contentum in venis non posset expurgari per renes; nam in re aibus dantur arteriæ emulgentes, & venæ emulgentes, per venas emulgentes non potest fieri transmissio feri, quia adsunt valvulæ

ulæ (vt dicunt Vvalæus, & Bartholinus) per quas impeditur motus humoris à caua ad renes; g. superest, vt solum fiat per arterias emulgentes, per quas nequiret effici expurgatio feri contenti in venis, nisi daretur sanguinis circulatio.

8 Nullo modo partes extremæ quæ & lividæ apparent, & quasi mortuæ ob frigus, possent rursus calorem, colorem, & vitam recuperare nisi daretur sanguinis circuitus; Quomodo eni possēt attrahere, quibus vita, & calor penè extincti sunt? & quomodo possent sanguinem, & spiritum recipere, quibus

quibus non datur aditus, quia
meatus sunt condensati, & ge-
lato sanguine repleti, nisi con-
tentum dimitterent? :g. neces-
sariò est admittendus sangui-
nis circuitus.

9 Neque posset reddi ratio
adequata, si non daretur san-
guinis circulatio quomodo ex
lue venerea, siue ex morsu ca-
nis rabidi totum inficiatur cor-
pus Licet enim ex alio plantis
pedum alligato sympathice ha-
beatur expectoratio, tamen cum
actio non detur in distans, quo-
modo expectoratio observare-
tur, nisi qualitates, quædam,
licet occultæ, communicaren-
tur

tur V. G. cordi per recursum
sanguinis ab ipsis pedibus ad
Cor.

10. Cum natura perfecta,
& quasi diuina nihil frustra
agat, sequitur non alia de cau-
sa fuisse fabrefactum Cor (pre-
ter perfectionem sanguinis,
siuè preter eiusdem generatio-
nem per iteratos recursus) nisi
ad alimenti distributionem,
quod manifestè inde colligi-
tur, quia dantur Plant' anima-
lia dicta, vt Ostrea, Mitilli, &c.
quæ corde sunt destituta, in il-
lis enim non requiritur alimē-
ti distributio. Alia dantur fri-
gidiora, & exanguia, vt cocleæ

conchæ, quæ quia impulsu aliquo ad alimenti distributionem indigent, eis natura non cor, sed vesiculam quâdam concessit, pulsum facientem, quem non nisi æstate discernere licet. Animalibus alijs paulò maioribus, ut potè sanguineis indigentibus impulsore ad alimentum distributionem, cor concessit ex vna auricula, & ex vno tantum ventriculo constructum, ut sunt lacertæ, ranæ, serpentes, testudines &c. Animalibus verò maioribus calidioribus, & perfectioribus, ut potè plurimo feruentiori, spirituosiori sanguine abundantibus cor natura

ura concessit robustum duo-
 bus ventriculis, & auriculis cō-
 structum, vt propter corporis
 magnitudinem, & habitus dē-
 sitatem alimentum fortiùs, ce-
 lerius, & impetù maiori pro-
 traderetur: g. per cor habetur
 sanguinis distributio: g. sāgui-
 nis circulatio, cum tanta san-
 guinis copia, quæ vnica die à
 corde distribuitur, nec tota à
 partibus absumatur, nec de
 nouo generetur.

II In suspēsis facies tumi-
 da ex distentis venis, & rubra
 non appareret nisi ad Cor im-
 pediretur sanguinis recursus;
 soluta nāque catena detume-
 scit

scit paulatim tumor, & rubor faciei, nisi ob frigus in minimis venulis sit ita impactus, ut effluere nequeat: g. arguitur sanguinis circulatio.

12. Ex strictissima ligatura in venæ sectione, neque ru-
nient venæ neq; sectæ emittūt sanguinem; sed id accidit, quia compresse sunt arteriæ: g. ab arterijs in venas cōmunicatur sanguis; Minor patet, quia laxato aliquantulum vinculo sā-
guis emanat; Neque dicendum à superiori vena emanasse, quando quidem cōpressa vena cis foramen verius manum, sā-
guinis exitus impeditur, & la-

xato

xato totaliter vinculo, neque
emanat: g. &c. maior è mani-
festissima, (autopsia demon-
strante) g. datur sanguis cir-
cuitus.

13 Si atramentū per siphonē
(Inventore Ioan: Sigism. Elf-
holzio, quod vidi Romæ ce-
lebratum à Doctissimo Geng.)
in arterias brachij V. G. in-
troducatur, ita tument venæ,
vt sectæ atramentum emittāt,
& si introduci cogatur idem
atramentum in venas, etiamsi
siphonis baculū magna vī im-
pellatur, nequit introduci: g.
signum manifestum in venis
motum sanguinis esse à circū-
ferentia

ferentia ad centrum, in arterijs
à centro ad circumferentiam.

14 Idem Elsholzius secta
vena in viuente cane per siphonem
introduxit extractum op-
ij liquidum, in alio spiritum
vitæ aureum, in altero vinum
æmeticum, in alio aquam in
qua arsenicum album erat de-
coctum, & vniuscuiusq; medi-
camenti proprius fuit observa-
tus effectus. Primus enim canis
paulatim cæpit dormire, & ita
soporosus factus fuit vt nil mo-
ueri observaretur, tandem cæ-
pit paulatim expergefieri vt
perfectè conualuit. Secundus
copiosè multarum horarum
spatio

spatio deiuit. Tertius ita vomuit, ut præ nimia dosi extinguitus fuerit: Quartus post varia symptomata quæ quis pati solet dum arsenicū ore sumpserit, vitæ satisfecit. Medijs hisce experientijs propter vulcus in hominis crure per venam prope vulcus immisit liquorem balzamicum alteri propter febrem immisit liquorem febrifugum, alteri tandem propter scorbutam pariter per venam aquam cochleariam introduxit, & felici cum successu; Sed nisi daretur sanguinis circuitus non posset reddi ratio adequata dictorum effectuum: g.

D ne-

necessariò è admittendus.

CAPVT SEPTIMVM

DE NECESSITATE CIRCVLATIONIS.

Sanguinis Circuitum in
vsum partium contin-
gere affirmat Vvalæus, vltèrius
.n. perficitur, vt spirituosiores
sanguineas partes recipiant.

Ad sanguinis integritatem
conseruandam maximè con-
fert, nam.

Vitium capiunt ni moueantur aqua.

Ex quiete enim vt ait Brauo
grumescit sâguis, & motù coa-
gulatio impeditur, vt obseruât
mulieres in suo sanguine,
quem si capiunt non coagula-
tum,

tum, eum manibus agitant, quousq; frige fiat, qui si nō moveatur statim grumescit, proindē nē humores coagulentur necessarius ē sanguinis circuitus, neq; posset sanguis moveri nisi circulariter.

Confert etiam nē quietus putresceret, ut accidit in sanguine, qui causa est tumoris, & ut humores in partibus extremis refrigerati redeuntes ad Cor, iterū propriam recipiant temperiem.

Valeat etiam, ut aptior fiat distributio per arterias ad omnes partes, & ut motus cordis conservari possit.

Media sâguinis circulatione multæ questiones de missione sanguinis collûtur, multiq; medicorum errores corriguntur.

CAPVT OCTAVVM

In Neruis, in Cerebro, in Emulgentibus,
in Spermaticis, in hæmorrhoidibus,
in vena vmbilicali fetus in vtero
existentis dari circulationem
ratione, & autoritate
demonstratur.

QUamquam sanguis non
eadē celeritate moueatur
in omnibus partibus: In angu-
stioribus enim vijs tardiùs, in
amplioribus celeriùs, mouetur
tamen in omnibus; & quidem
tum de venis, tum de arterijs
ma-

maioribus nulli est dubium.
 Controuersia est de minoribus
 quã faciliè resoluemus ex par-
 tium structura, & ex maiorum
 autoritate.

In renibus circuire serum,
 in spermaticis sperma, in he-
 morrhoidibus sanguinem in-
 ter fetum, & vterum dari ali-
 menti circulationem aperte,
 & clarè probatur; Ante quam
 autem ad harum partium in-
 spectionem me conferam, ad-
 notandum nõ solum inter ve-
 nas, & arterias dari sanguinis
 circulationem, sed in nervis
 ipsis; & quinquam spirituum
 circulationẽ in nervis admit-

tat Hogelandius Regius, adeo
 ut spiritus in nervos insinuati
 per caudices nervorum partim
 communicentur venis, & per
 venas cordi, à corde verò nerū
 ad cerebrum demandari, à quò
 ad ipsos nervos, partim diffi-
 pari per insensibilem transpi-
 rationem, tamen aliam viam
 agnoscit Celeb: Molinettus (In-
 ventore huiusmodi circuitus
 Doctissimo Vvillio.

Cum enim spinalis medulla
 sit numerosa congeries sta-
 minam medullarium, nimirū
 tum ipsius duræ meningis elō-
 gatæ, tum piæ, & preter has cō-
 munes etiam cerebro detur in-
 terior

terior alba, & medullaris à medulla cerebri ortum habens, ut vult Bartholinus, quam sinum habere multi probabiliter affirmant; siue dicam cum Molinetto in spatijs duræ meningis dari fistulam tenuiorem, ac multò graciliorem, ac peresiguū sinum ex tunica telæ araneæ simili constantem, & addam cum Ing. Villio in cauo spinæ dari truncum adhuc tenuiorem ortum ducentem ab interna ossium superficie, & durum meningem immediatè ambientem quæ, & ipsa varis licet minimis, & non nisi microscopij ope cōspicuis est in-

D 4 structa,

structa, hinc sequitur, cum datur sinus, per quem remeare possit sanguis, & dentur ipsæ membranæ vasis plurimis, & sanguine redundantibus perfusæ, difficile non esse creditur etiam in nervis dari sanguinis circuitum.

Cum enim ut ait Molinæus Pia mater sit vasis multis perfusa, per quæ medullare corpus sanguinem excipit, quo nutriretur, & sanguis non ita gnet in vasis cōtra circulationis leges, neque per eadem remeet, per quæ influxerat, sequitur eūdem sanguinem defunctum officio suo, in medullares

lares sinus, siue spinales de-
fluere, quorum exitus est par-
tim in sinus laterales capitis,
partim in iugulares venas, quo
loco sinus in iugulares se exo-
nerat, cum fuerint à carotidi-
bus repleti, quamquam etiam
plurima possint assignari vasa
lateralia à ceruice erumpentia
nummero æqualia vertebri-
deuehentia sanguinem à sinu
spinali in ceruicalem venam,
preter alia tenuissima, quæ ex-
ceptum sanguinem à sinu in
azygon, & cavam ipsam refun-
dunt. Erat enim necesse, quod
quemadmodum sanguis in ce-
rebro superfluous remeat ad cor

id ipsum accideret in sāguine,
qui demittitur in neruos.

Placet hic ad confirmandā
sanguinis circulationem in ce-
rebro addere experimentum à
Bartholino propositū; Si enim
carotidas arterias, & iugulares
venas in collo liberaueris à par-
tibus adiacentibus, ac seorsim
ligaueris, & deindè per infl-
ctum arteriæ vulnus tubulum
contortum immiseris, ac insu-
flaueris, videbis carotidum ar-
teriarum propagines per vni-
uersum cerebrū dispersas tur-
gescere, donec cum propulso
sāguine aer inspiratus in sinus
se exonerauerit, & si in eisdem
sinus

sinus per predictum tubulum
 insufflaueris, obseruabis tumi-
 das venas ipsas iugulares; Lo-
 cum verò patentiore, in quo
 arteriæ per anastomosin vni-
 antur cum arterijs reto mirabi-
 le esse affirmat Vualæus, vt cõ-
 firmat Molinettus qui N. anat.
 hæc habet verba circuitum sã-
 guinis in cerebro cõfirmantia.

*Et quidem arteria ab interno maio-
 re carotidis ramo diuiscata sangui-
 nem a corde haustum, spiritumque
 primum animæ instrumentũ in omnẽ
 substantiam visceris effundunt alte-
 randum ad modum sensus. Venæ au-
 tem a iugulari interna rami maioris
 externi prodeuntes, superfluum san-
 guinem successiuè ab arterijs exor-
 bent, & ad cor reuehant.*

In renibus circuire serum Bartholinus affirmat, in his enim dantur tum arteriæ, tum venæ emulgentes; Per arterias emulgentes fertur serum vt expurgetur, & sanguis ad renum nutritionem; Quare si sanguis superfit, & totum serum non euacuetur, per venas emulgentes ad venam cauam deducuntur, & quâquam in venis emulgentibus valuulas obseruauerit Bahuinus, earumque vsum explicauerit, nè nimirum regrederetur serum in cauam, tñ. Harueius, & Bartholinus agnouerunt quidem valuulas, sed latiori parte cauam spectantes, acu-

acuminata verò, & lunari, quæ
renes, ne ponet nimirum ali-
quid defluere à caua in renes,
posset tamē à renibus in cauā.

In spermaticis dari circuitū
cum eodem Bartholino demō-
stro. In dextro enim latere duo
oriuntur vasa, ex ijs vna est ve-
na spermatica, quæ immédia-
tē à vena caua oritur infra
emulgentes, altera est arteria
spermatica, quæ immediatē
oritur ab arteria aorta, & licet
in via, quia complicantur, vni-
cum solum vas videatur, duo
tamen sunt. In sinistro duo pa-
riter procedunt vasa, vnum im-
mediatē à vena emulgenti, al-
terum

terum immediatè ab arteria
 emulgenti, & licet in progres-
 sù complicentur, duo tamen
 sunt vasa. Hinc indè terminā-
 tur in testes. Vsus est, vt per ar-
 terias spermaticas sanguis, &
 spiritus in testes deducantur ad
 futurum semen generandum,
 & ad testium nutritionem. Sā-
 guis autem superfluous ad semi-
 nis generationem, & testium
 nutritionē per venas sperma-
 ticas transfertur, in dextris ad
 venam cauam, in sinistris ad
 venas æmulgentes. Neque me-
 tuendum nè semini iste recur-
 sus materiam præripiat, neue
 spiritus genitor supernè reime-
 at,

at, nam non retrocedit nisi ea pars, quam testes sibi, & toti minus necessariam remittunt. Arteriæ nāque deferentes maiores sunt venis reuehentibus, quod signum est testes non tantum emittere, quantum acceperūt. Spiritus verò vī propria testium retinetur.

In hemorrhoidibus circulari sanguinem arguimus, tum ex venis, tū ex arterijs hemorrhoidalibus. Venæ hemorrhoidales duplices sunt internæ, & externæ; Internæ oriuntur à vena porta, externæ à venæ cauæ ramo hypogastri-
co; Internæ inseruntur per re-
cti

Et intestini substantiam membranofam, quæ amat sanguinẽ crassiorem in liene genitum, & per arteriam celiacã, & splenicam communicatum: Externæ insærantur per ani musculofam substantiam, quæ quia puriori sanguine gaudet per arterias hypogastricas deducitur. Quare si sanguis vterque nutritioni superabundet vnus deportatur ad portas per venas supradictas, alius ad venæ cavae ramum hypogastricum.

Per umbilicum quoque fieri sanguinis motum in orbem in fetũ in utero existente credunt Vvalæus, Harueius, Bartholinus,

tholinus, & alij. Datur enim vena umbiliculis, & arteriæ umbilicales. Vena umbiliculis, quæ multo est maior arterijs, à placenta uteri ad hæpar infantis in utero existentis deferitur: Dux arteriæ in iliacis pueri inferuntur, & cum vena ad uterum placentum feruntur, in qua extremitates, & ramificationes tum venæ, tum arteriarum diffeminantur, ut videre est in tab. 21. Bartholini, & 32. Bauhini fig. 2.

Uſus venæ eſt, ut ſanguinẽ à placenta hauriat, & in hepar infantis deferat. Uſus arteriarum in ſententia Aurantij, &

re-

centiorum non est vt deferatur
per eas cum sanguine spiritus
vitalis, num hæ arteriæ nō iu-
guntur arterijs vteri, sed vt sā-
guinis partem fetus nutritioni
superfluam, per iliacos acceptā
in placentam deferrent, ibique
quia debilitatus, perfectior
redderetur.

Motus autem circularis est
iste. Ex Vtero materno sanguis
venam vmbilicalem intrat, à
qua in hepar pueri, venam ca-
uam, & dextrum cordis ven-
triculum progreditur; licet enī
cor sit imperfectum, tamen
pulsat. Iam ex dextro cordis
ventriculo transit in venam

arte

arteriarum, indè quia pulmones non respirant per peculiarem ductum in aortā, siue per peculiare venæ cauæ foramen arteriam venosam, & sinistrū cordis ventriculum ingreditur, è sinistro in aortam, ex aorta ad arterias iliacas vadit, ex iliacis ad umbilicales, ex umbilicalibus ad placentam, in qua cum arteriæ, & venæ per anastomosum uniantur, sanguis arteriarum umbilicalium venā umbilicalem ingreditur, & per eam eodem modo deferitur. Ligatis enim arterijs intumescunt, & pulsant ex ea parte, quæ fetum respicit. Vena verò ligata in-

intumescit eis impedimentum
velius placentiam.

CAPVT VLTIMVM

EX QVIBVS CAVSIS MOVEATUR SANGVIS.

Sanguis cum per intro-
sceptionem alimenti nō
alatur, sed solum resultet per
additionem partis ad partem,
sequitur eum haud esse anima-
tum, & proindē nullum habe-
re motum (cum omnis actio ab
anima sit) preter motum ele-
mentarem, quo solum posset
moueri deorsū; Vt igitur cor-
pori in alimentum cadat, duo
necessaria sunt, mobilitas nē-
pē, & vrgens aliquod seu im-
pellens;

pellens; mobilitatem recipit
 sanguis partim à sero, partim
 ab aere, multis consentienti-
 bus autoribus; Vrgens autem
 causa alia non assignatur ab
 Harueio quam impulsus cor-
 dis; Verum quia dubitatur, nū
 ab impulsu cordis, possit etiam
 moueri extrauenatus, ideò as-
 ferendum reor, sanguinē mo-
 ueri à facultatibus animæ non
 principalibus expultrice nimi-
 rum, & attractrice, consenti-
 entibus Back Vvalæo, & Bra-
 uo. Quecumque enim pars, ut
 alatur appetitum innatum ha-
 bere necessè è, quò atrahat
 quod sibi connaturale existit,
 &

& expellat, quod superfluum est. Observamus enim deficiente alimento in Ventriculo fieri quamdam corrugationē, à facultate attractice, per quam formaliter constitui appetitū naturalem, multi autores affirmant.

Et si per attracticem, vel expultricem non fieret sanguinis motus, frustra natura construxisset villos rectos ad atrahendum, transversos ad expellendos, & obliquos ad retinendū. Unde quia sanguinis maior copia continetur in venis, & arteriis, ideo nulla pars nostri corporis potest assignari, quæ
ma-

maiolem copiam villorū habeat venis, & arterijs.

Quenam autem facultas ex his sit actiuor, vt moueatur sanguis, determinari non posse arbitror, cum id pendeat ex partis exigentia, sicut enim in intestinis tenuioribus maior est attractio, quam expulsio ob materiei indigentiam in crassioribus maior expulsio ob materiei superfluitatem; itā in venis, & arterijs, pro diuersitate partium exigentiæ necesse est, vt actiuius ipsa diuersificentur in diuersis locis.

TRA-

TRACTATUS
IATROPHISICI
PARS SECVNDA



VCVSQ; circuitum
sanguinis demon-
strado, veritati ar-
cem construximus,
experimentis, ac rationibus
firmissimis materiem suppedi-
tantibus, necesse iam est, vt eã
contra aduersarios, capitis no-
stri obiectu, & recentiorum
auctoritate propugnemus.

E CA-

CAPVT PRIMVM
ADVERSARII FVNDAMENTA
DILVVNTVR.

PRimum Aduersarij fundamentum est, triplicem dari sanguinis motum, Proprium nempe, Iuuantem, & Violentum, & patefacto, quinam sint hi motus, arguit, quod si solus sanguis venarum ob metũ, seu aliquamcũq; causam recurret in Cor (quem motum vocat iuuantem cum deberet suppeditari ab arterijs) homines nõ palleſcerent, neq; i cute formicarẽt quasi oberratione detinerent, subditq; motum sanguinis arteriarum **Pueri**


ri in Vtero, & in venis mēstē-
tericis non esse propriū na-
turæ, sed iuuātem.

Respondeo sanguinem nō
habere vllū motū propriū
per, se sed solum per accidens;
siue enim fieri possit ab attra-
ctrice intrinseca naturali, vel
præternaturali, siue ab attra-
ctrice extrinseca, & per has cō-
stituatur motus iuuans, & vio-
lentus, quos admittit Aduer-
sarius, hoc parum refert; cer-
tum enim est, sanguinem mo-
tu proprio non cieri; si verò
motum aliquem insitum ha-
beat, eum non nisi elementa-
rem esse affirmo, quod per ve-

nas non moueri, ex eo conuincit. , quia in his sursum mouetur. deorsum enim per elementarē posset solum moueri. Vnde ad id, quod deberet suppeditari ab arterijs sanguis, si in venis recurreret ad Cor, respondeo, negando suppositum; non enim ob metum pallefcunt homines, quia sanguis recurrit ad Cor, sed quia recurrunt spiritus. Consentaneum namq; rationi nō est, quod sanguis saltem in artubus contentus possit contineri, vel in corde, vel in partibus propè Cor, licet multi dicant aliquantulū con-
 crescere (quam opinionem à
 Bra-

Brauo, & Coringio confirma-
tam obseruo) Præterquam
quod in nimio studij feruore
non feruet caput, quia sanguis
eo confluxerit, sed quia spiri-
tus dissipati fuerunt, & ob exi-
gentiam in maiori copia ad ca-
put transmissi. Sed esto, quod
admittamus aliquem recursû,
pallor nõ indè prouenit, quia
non suppediteť. sanguis ab ar-
terijs, imò, ne detur vacuum,
necessariò si recurrit, debet
suppeditari, quum enim in cõ-
fusione quedam ponat. massa
sanguinea, id circo ad tuendã
partem principalem spiritus
auocant. . Illam autem quasi

E 3 for-

fornicarum oberrationem in
 cute à sanguine nō euenire ar-
 bitror, sed ex influxu impedi-
 to spirituum animalium in ner-
 uis; impeditur autem influxus
 vel à causa extrinseca, vt esset
 leuis compressio, eaq; extrinse-
 ca, vt accidit, quando quis est
 in incommodo, vt plurimum
 situ, vel sedet, vel equitat &c.
 vel à causa intrinseca, eaq; fla-
 tulenta, profectò Cramphus
 Neruosi generis, & non venosi
 esse affectionem indè arguo,
 quia pars motu, & sensu ferè
 destitui videt., quæ ambæ ner-
 uor., & non venar. affectiones
 sunt. Motum autem illum, ,
 quem

quem habet sanguis in arterijs
 pueri in vtero , esse proprium
 naturæ affirmo, quatenus à fa-
 cultate naturali mouet. , &
 quatenus perficit. per vias à
 nāra , instructas . Verrsimile
 enim non est, illa vasa ad con-
 seruationem fuisse à natura in-
 structa , vt ait Aduersarius , &
 eum motum esse contrarium
 motui proprio perfecti anima-
 lis .

Secundum fundamentum
 Aduersarij est , non omnibus
 venis associari arterias, vt con-
 tingit in vena sine pari, ac da-
 ri varias partes , ad quas defe-
 rant. arteriæ , & nullus ramus

venæ cauæ, vt sunt lien, & Vē-
trculus, & conſequenter plu-
res eſſe venas, quam arterias.

Reſpondeo, id verum ſem-
per non eſſe, cum (vt dicit do-
ctiſſimus Bartholinus, omnis
vena, vt plurimum, ſociam ha-
beat arteriam, cui incumbat,
& rarò inueniaſ. vena, docen-
te Galeno, ſine arteria, num-
quam autem arteria ſine vena,
quod etiam prolatum obſeruo
ab ingenioſiſſimo Molinetto,
qui lib. anat. lib. 5. Cap. 6. hæc
habet. Succedit vena caua vas
alterum vniuerſale æquè am-
plum, nec minus neceſſarium,
ideoq; arteriæ tam arcto con-
iugio

iugio iunctum, vt sine vena arteriam, aut vice versa, sine ista, nūquam venam reperiās; sed esto, det. pars, quæ venam habeat, & non arteriam, hinc argui; minimè posse arbitror, eam venam sanguinem traxisse ab hepate, & nō ab arterijs, cum in alia parte, vt dicit Vvalæus, consentiente Brauo possit vena excipere sāguinem ab arteria, & in aliam partem ab arterijs remotiorem eum ferre, vt accidit profectò in vena sine pari, quam citat Aduersarius, quæ vena, licet in dextro latere, vt plurimum sit, tamen post eius initium, quod est in-

E s ter

ter quartam, & quintam vertebram thoracis, non nihil extrorsum, & dextrorsum reflectitur vsq; ad octauam, & nonam vertebram, vbi medium occupare incipit, & iste truncus ad interualla octo inferiorum costarum mittit vtrinque ramulos intercostales, vt asserunt Laurentius, & Bartholinus, qui per anastomafim hinc indè iunguntur cum ramis thoracicæ inferioris, prodeuntibus à basilica, & cum arterijs intercostalibus.

Quam autem euidentis sit error Vesalii, quem sequitur Adversarius, indè arguitur, quia

ab

ab omnibus ferè Auehoribus
eius opinio refellitur, sentien-
tis, in Pleuritide semper esse
secundam venam dextram.

Quamuis autem plures, &
capaciores sint venæ, quam ar-
teriæ, tamen sanguis in arterijs
copiosius, vehementius, ac ce-
lerius fertur, quam in venis,
probat, quia laxato vinculo
in arteria secta, adhuc sanguis
in copia, & cum impetu fluit;
secus verò accidit in venis, in
quibus sectis, & laxato vincu-
lo, nisi adsit magna plethoria,
vel nimis amplum sit foramen
ne gucta quidē sanguinis ema-
nat. Maiorem verò requiri nu-

merum venarum, quam arteriarum probat Brauo, hac ratione, quia arteriarum numerus debet esse sufficiens, ut sanguis omnibus partibus comunicetur, & ut superfluus reflueret ad hepar, & ad Cor; maior etiam in extremis partibus venarum exilium requiritur numerus, quam arteriarum.

Quantis autem ad lienem, & Ventriculum nullus venæ caux ramus deferatur, tamen non tollitur; quin ad Ventriculum venæ Gastricæ, ad lienē splenicæ deferantur, ambæ à vena porta originem trahentes.

Ter-

Tertium fundamentum
 Aduersarij est, non posse dari
 transitum ab vno extremo ad
 aliud extremum absq; medio;
 Vnde cum constare affirmer,
 dissimillimum esse arteriosum
 corpus à venoso, & nullum in-
 tercedere medium, impiumq;
 esse nomine mediarum partiū
 intelligere carnosas, existimat
 in his non posse fieri transitū,
 subditq; arterias omnes pulsa-
 re, nullum autem ex venis, cū
 diuersis lōge operibus diuersa
 instrumēta fabricauerit na-
 turā.

Respondeo, dari posse trá-
 situm sanguinis ab arterijs in
 venas

venas sine alio medio, cum per
 anastomasm simul mutuò iū-
 gantur, ex qua coniunctione
 tollitur omnis implicantia; ;
 Quamuis autem per anasto-
 masim non vnirentur, adhuc
 impium non esset, vt partes
 carnosæ esset mediū, per quod
 fieret transitus. Quamquam
 enim Cartesius adeo necessa-
 rias ponat anastomases, vt per
 has solas sit data via ad sāgui-
 nis circuitum perficiendum,
 tamen Recētiores ferè omnes
 per ipsam corporis substantiā
 fieri posse transitum tenent, eo
 indicio, quod inflammatio-
 nes, & tumores detamescant,
 si

si vena secetur vsq; ad coloris mutationem, ad quod confirmandum Iacobi de Back lib. de Motu Cordis. ect. 3. cap. 6. placet verba recitare : *Non necessarium esse existimo anastomases articularum, & venarum ad intuitum manifestos, statuere siquidem per ip. a corporis substantiam, is exquisitè diuisibilis permeare potest, per carnosam quidem velocius quam per compactiorem.*

Quod autem venæ non pulsant, iam concedo, quod semper pulsant omnes, & singulæ arteriæ, nego; Cum enim arteriæ capillares non ita subito emittant, nec magno impetu in his utpotè exilibus impellat

san-

sanguis, sequitur, ut non pul-
sent, idq; licet experiri in dis-
secta arteria, in qua vix pulsus
perlentietur, si liberè exeat sã-
guis; Aperta enim via sanguis
exiens eam non distendit, præ-
terquam quod arteriæ capilla-
res videntur venæ non solum
côstitutione, sed officio. Quã-
tò enim arteriæ sũt cordi pro-
pinquiores, tantò magis diffe-
runt in constitutione à venis,
& quantò remotiores tantò si-
miliores redduntur; si verò ali-
quandò pulsent, indè id acci-
dit, vel quia à Corde plus soli-
tò vehemētius pellitur sanguis
vel quia ampliores sunt, seu
dicam

dicam cum Brauo, venas non indigere pulsatione, quia solū ad sanguinem diferendum sūt constructæ à natura, indigent verò facultate vitali, à quā moueantur arteriæ, quia ad sanguinem continendum, & spiritus impartiendos debent inservire.

Quartum fundamentum. Aduersarij est dissentaneū esse asserere, spiritibus concurentibus arterias dilattari, non autem propria virtute; licet enim spiritus sint causa maioris dilatationis, tamen propria virtute debet fieri aliqua prior relaxatio in ipsis arterijs, vt patet in

in musculis thoracis, in quibus principium dilatationis est ab intrinseco agente, spiritus verò inclusus est terminus maioris dilatationis.

Iam Arterias spiritibus concurrentibus non dilatari, concedo, nego autē id solum fieri propria virtute, itaut hæc sola sit in priori causa dilatationis; dixi namq; arterias impleri, ut Vires, & non ut folles, & sanguinis impulsione esse causā dilatationis, ut probat Harueius, quia in aneurismate persētitur pulsus, licet arteriæ tunica absit, idq; ob solius sanguinis impulsu, cum caro dilatatione

tatione nequeat sanguinē trahere, vt confirmant Vvalæus, & Riolanus. Verum reor cum eodem Vvalæo, & Bartholino esse concedendam arterijs aliquam facultatem, qua iuuetur dilatatio, nam sine aliqua facultate intrinseca non omnes eodē momento æqualiter pulsarent, cum id, quod in distans mouetur, vbiq; esse non possit, & consequenter eodem momento parere distensionem, vbiq; non valeat. Neq; ex eo, quod thoracis dilatatio sit ab intrinseco agente, argui potest ab eodem fieri dilatationem in arterijs. Pulsus enī est actio merè

merè naturalis, respiratio verò
partim est naturalis, partim
animalis, vnde voluntariam
ab instinctu vocat Laurentius.

Quintum Aduersarij fun-
damentum in eo consistit, fri-
gidiorum esse tum spiritum, tū
sanguinem in extremis, quam
in corporis medio, vt probant
noxæ, quæ ex magnarum ve-
narum sectione magis accidūt
quam ex incisione minimarū,
aut à cucurbitulis; Extremorū
etiā sanguinē prauū declarant
naturæ dispositiones, tumores
nempè, vlcera, inflamationes.

Respondeo, hoc solum ve-
rificari de sanguine contento
in

in arterijs; non autem de sanguine contento in venis. Quò enim sanguis in arterijs est cordi propinquior, eo calidior, & spiritosior est; & quò remotior eò aduertitur minus à venoso differre, nam quantò propinquior est cordi, tantò abundat maiori copia caloris, & spirituum, qui sensum deperduntur. Diuersum autem accidit in venis, quarum minores rariorem, calidioremq; sanguinem habent, quam maiores; Videatur de hac re Bartholinus. Neq; hinc sequitur maiorẽ fieri deperditionẽ spirituum à sectione minimarum, quam maiorũ

ve-

venarum, ut credit Aduersarius
 us in absurdis, quo in loco cō-
 trarium demonstrabo; neq; tu-
 mores, vulcera, inflammatio-
 nes crassitiem sanguinis in
 venis extremis demonstrant,
 cum hæc omnia fauere videā-
 tur motui sanguinis in orbem,
 ut dicit Vvalæus, possunt enim
 indè oriri, quia extrauasatus
 sanguis nequeat in vasa redire,
 vel quia à dolore, calore ī car-
 nem trahatur, aut ab obstru-
 ctione sanguini occludat. trá-
 situs, iuxta celebre Poëtę effatū.
Vitium capiunt ni moueantur. Aqua
 Vnde reor, esse accidentale di-
 scrimen inter sanguinem ve-
 nosum,

nosum , & arteriosum , quemadmodum tum sanguis maiorem , ac minorem arteriarum , cum lac ebulliens , & refrigeratum accidentaliter defferunt inter se , vt docent Vvalæus , Bartholinus , & alij .

Sextum Aduersarij fundamentum est , venas sæpissimè coniungi , sæpissimè disgregari , ac iterum in ramificationibus coniungi , ac disgregari , quod rarò accidit in arterijs .

Respondeo , licet hoc concedam , proptereà non tolli , quò minus in orbem detur sanguinis motus .

Septimum fundamentū est ,
fal-

fallum esse dari anastomasim inter venas, & arterias, licet Patrum authoritate id videatur certissimum.

Mea responsio responsione tertia palam fiet, in qua suas Aduersarius de hac re refert rationes.

CAPVT SECVNDVM LOGICIS OBJECTIONIBVS RESPONDETVR.

EX iactis fundamentis, & logicis rationibus inde petitis, ita arguit Aduersarius. Si daretur sanguinis circuitus, calidior in extremis consisteret, quam in corporis medio; observatur autem frigidissimū esse,

esse, & crassissimum in extremis; ergo &c.

Respondeo, distinguendo maiorem, calidior consisteret in extremis arterijs, quam in maioribus, nego maiorem, calidior consisteret in venis minoribus, & extremis, quam in maioribus, & internis; concedo maiorem, & eodem modo subdistinguo minorem: observatur, crassissimum esse, & frigidissimum in extremis arterijs facta comparatione cum sanguine contento in ipsis arterijs maioribus, concedo minorem; in venis externis facta comparatione cum venis maioribus,

F &

& internis, negotiū minorem;
 Dixi enī in responsione quinti
 fundamenti, in sanguine,
 quantò magis distat à corde,
 tanto fieri spirituum, & calori-
 ris amissionem. Hic tamen ad-
 do, & concedo, sanguinem
 venosum esse calidiorem in
 maioribus venis, quam in mi-
 noribus, si sermo sit de calore
 ascititio, non autem de insito,
 qui non differt realiter loquē-
 do, ab ipsis spiritibus.

Ratio secunda Aduersarij,
 cum non possit dari transitus
 ab vno extremo ad aliud ex-
 tremum absq; medio, quomo-
 do sanguis nunc tantæ calidi-
 tatis

tatis est, vt ventilatione indigeat, immo post ita frigidus, vt reliquæ partes omnes calidiorem contineant? Pulsus enī ab indigente facultate fit.

Respondeo, licet non possit dari transitus ab vno extremo ad aliud extremum absq; medio, tamen ex falsa suppositione arguit Aduersarius idē accidere in sanguine, quia videlicet in arterijs tantæ caliditatis sit, vt ventilatione indigeat, secus verò in venis; Ostendit enim per successionem fieri spirituum deperditionem in sanguine, vnde non multū differre sanguinem in arterijs

minimis contentum ab eo, qui
 in minoribus renis continetur;
 Neq; pulius fit solum ab indi-
 gente facultate, vt iam osten-
 di, neq; propter euentilationē
 sanguinis arteriosi, nam vsus
 pulius ex Bartholino est; Pri-
 mo, vt calor partium innatus
 temperetur, euentiletur, & re-
 frigeretur; Aer enim in arte-
 riarum dilatatione motu vacui
 attrahitur. Secundò vt sanguis
 arteriosus nutritioni aptus in-
 desinenter in minimas arte-
 riolas, & exindè in partes trās-
 mittatur, quæ cum non nu-
 triantur omnibus partibus sā-
 guinis, qui impellitur, reliquū
 ad

ad venas effundunt.

Tertio, ne sanguis venarū quiesceret, & putresceret; Ne autem sanguine Cor destitueretur ex continua expulsione ab impellentibus arterijs, iterum per venas continuò subministratur; Sed esto, fiat pulsus propter euentilationem sanguinis arteriosi, nonne quò remotior est à corde sanguis, eo minus indiget euentilatione? Certum enim est, maiore fieri pulsum in arterijs maioribus, quam in minoribus. Vndè cū arteriæ exiles vt plurimum nō pulsent, sequitur, sanguinem in illis contento sufficere eue-

F 3 tula-

tilationem, nō per respirationem, sed per transpirationem factam, qua posse conseruari sanguinem venolum, ex eo arguitur, quod sanguis in minimis arteriolis existens conseruatur sine respiratione, id ipsū contingere potest in venoso, nam deficiente pulsu, successiue etiam cessat euentilatio facta per respirationem, & successiue sanguis transit ab vno modo respirationis ad alium. Vnde sequitur manifestè in sanguine non dari transitum ab vno extremo ad aliud extremum absq; medio.

Addit

Addit insuper Aduersarius, sanguinem arteriosum modò tenuem esse, modò crassum, modò frigidum, modò rubrū, modo nigrum, subditq; nigredinem, & crassitiem non provenire à venis, vt & refrigerationem, cum id probent euidenter naturæ depositiones, vt tumores, varices &c. quæ omnia fiunt à natura semouente crassitiem.

Hanc diuersimodam sanguinis complicationē, respondeo, posse observari, & verificari in corpore à naturali statu recesso, nam cum Massa sanguinea sit in confusione quadam,

dā , ita vt vna potius pars ver-
 gat ad putredinem, quam alia;
 hinc mirum non est, si in eius
 euacuatione pars purior obser-
 uetur, alia crassior, alia nigra,
 alia rubra &c. Et si aliqua ob-
 seruetur diuersitas in corpore
 sano, id accidere arbitror, non
 ex frigefactione ī venis, sed ex
 humoris etherogeneitate, &
 absq; eo quod natura semoueat
 crassitiem, & eam deponat ad
 partes externas, tamen oriri
 possunt tumores, varices &c.
 vt dixi, ex impedito transitu
 sanguinis. Videmus namq; ex
 venæ sectione tumores aliquā-
 dō euanescere, quia nimirum
 ille

ille sanguis ad venas retrahit.

Tertiò Aduersarius ad id quod affirmatum est, vasa arterialia esse pauciora numero, & minora, mole tamè sanguinem velociter suppeditari venis ab arterijs, tria dicit, primò nempe venā humeralem, qua, humerum ingreditur, nullam tangere arteriam, & venam sine coniuge proximam habere arteriam. Secundo in quibusdam mutilatis dari venas sine arterijs, vel arterias sine coniunctione cum venis, vnde si accidat fluxus sanguinis per humeralem non ab arteria subministratur, quia remota arte-

F s ria

rias sanguis communicatur nō
 à propaginibus, quia per tran-
 sversim sectæ, non amplius gi-
 gnuntur novæ propagines.
 Tertio si aperiatur vena iugu-
 laris, & eodem correspondenti
 loco scindetur vena iugularis,
 & æquum tempore spectetur
 sanguinis defluxus ab utraq;
 observabitur quantitate lon-
 gè maiori esse eum, qui à vena
 fluxerit.

Ad primum respondeo, li-
 cet vena humeralis nullam in
 humero tangat arteriam, & li-
 cet vena sine pari proximam
 habeat arteriam, & non con-
 iunctam, hinc tamen non tol-
 litur;

litur; quominus in alijs partibus vniantur, vt dixi in respō-
sione secundi fundamenti.

Ad secundum respondeo, hic esse sermonem de venis, & arterijs in constitutione naturali positis, quemadmodum enim accidunt monstra in morbis, & in natura, ita mirum nō est, si in mutilatis, quamuis vena humeralis nō tangat arteriam, & in ijs dentur aliquādo venæ sine arteria, fiat fluxus sanguinis. Occultos enim, & cæcos naturæ meandros in dissectione haudquaquam intuemur, vndè quod *Nobis latet, natura est manifestum*; Præter-

F 6 quam

quam quod amputatis membris, dicit Vvalæus motum illum in mutilo sanguinis fieri ex arterijs in venas, cum anastomases non sint in solis extremitatibus, sed in intermedijs locis, ut infra patebit; Subditq; etiam Vvalæus per ipsam carnem posse fieri motum ab arterijs in venas, sicuti superius dixi in sententia tum Jacobi de Back, tum Vvalæi, cuius hæc sunt verba, prima Epistola ad Bartholinum: *Quare neq; omnes anastomases in extremitatibus tantum corporis sunt, sed & in locis intermedijs: Unde videmus, amputatis membris in mutilo tamen sanguinis illum motum ex arterijs in venas fieri.*

ri; Secundo, & sanguis ex arterijs per ipsum videtur posse carnem in venas redire; Videmus enim scita vena, usq. dum mutetur color, inflammationes detumescere, quum extravasatus sanguis per carnem trahatur.

Ad tertium responsionem dabo cap. te tertio.

Ad id autem, quod sequitur, num circumbeat serum, nū sperma, num sanguis crassus in hemorrhoidibus, num in vena umbilicali, quid sentiendum sit, diximus parte prima cap. 8.

Ultimò tandē affirmat Adversarius, non minorem difficultatem præstare naturæ motum ab internis ad externa,

cum

cum sanguis aliquandò excernatur ita putridus, vt fibris suis vix cohæreat.

Respondeo, hoc fieri à natura deponente, & segregante extrà corpus id, quod corpori noxium est, neq; hinc vlla deduci potest consequentia, quæ motui sanguinis in orbem aduerfetur.

CAPVT TERTIVM QVID DICENDVM DE EMPYRICA.

Primum experimentum Aduersarij, quo demonstrare putat, sanguinem non circumire corpus in orbem est huiusmodi, ligata duplici vinculo

culo arteria, & vena iugulari
 in agno maiusculo, secuit, ut
 tolleretur communio per me-
 dium venam, non autem arte-
 riam; Incisa igitur vena ex par-
 te superiori observavit sanguis
 ad uncias tres fluxisse, & inter-
 cepto vinculo ex parte super-
 riori arteriæ sectæ emanavit
 sanguis pariter ad uncias tres;
 vinculo iniecto, & secta eadē
 arteria ex parte inferiori pro-
 fluxit sanguis non adeo maio-
 ri impetu, Postremo secta par-
 te inferiori venæ liberaliter
 sanguinem fluxisse affirmat, li-
 cet non eo impetu, quo pars
 superior.

Sc-

Secundum experimentum eodem modo in Cane peractū fuit ; observatum est autem, quin ligaretur vena, intumuisse eam ex parte superiori, defecisse prorsus ex inferiori, & tū secaretur pars inferior eiusdem venæ, non nisi eodem modo fluxisse, quo solet fluere sanguis in venis retrò aures post amotionem hiruadinum; Ex utraq; vero parte arteriæ, allerit, fluxisse; ut supra.

Observavit autem æquali tempore maiorem copiam sanguinis colligi ex venis, quam ex arterijs.

Tertium habitum fuit in
 agno, in quo incisa vena ex
 parte inferiori fluxit sanguis
 abundè plus, quam in casu pri-
 mo; incisa parte superiori flu-
 xit sanguis maiori impetu; In-
 cisa autem superiori parte ar-
 teriæ; & peracta sectione bis,
 & ter nihil emisit, vnde forci-
 pe totam arteriam incidit, &
 maximo impetu sâguis erupit,
 ex arteriæ parte inferiori pro-
 rupit maiori impetu.

Cum autem diuerso vase es-
 ciperetur sanguis, obseruauit
 postera die nigrum sâguinem,
 & medico sero refertum, cum
 breui sanguinis rubri linea,
 qui

qui ex venæ superiori parte fluxerat, serosum verò, qui ex inferiori, longè rubicundior, & serosiores, qui ex arteria.

Quartum experimentum exhibitum fuit in duplici Veruice, quorum venæ non examinatae fuerunt. Ex arteriæ parte superiori in utroque sanguis emanavit, licet non eo impetu, quo ex inferiori.

Vt amotis litibus indulgenter agam cum Aduersario, non negabo, ab eo ritè peracta fuisse experimenta, etiamsi non concordent cum acutissimis, ac sæpius iteratis experimentis doctissimorum Virorum, quibus

bus satius esset fidem habere,
 quā Paulonio. Audiatur Vva-
 læus, qui loco citato hæc alle-
 rit. *Tum demum filo suspensam, &
 simul occlusam venam supra filum,
 & infra filum, aperuimus leui vul-
 nere. Statim autem ex ea vena par-
 te quæ à corde remotior esset, san-
 guis rivulose, copiose, & impetu ef-
 fluxit. Illa pars verò, quæ à filo cor-
 spectares, paucas tantum guttas de-
 stillanter dedit. Quod experi-
 mentum tab. i. expressit. Nir-
 hilominus etiam concessis, ex-
 perientijs, inconcessum stare
 intueor, motum sanguinis in
 venis esse à circumferentia ad
 centrum; In arterijs à centro
 ad circumferentiam.*

Rationem reddat Aduersarius, cur in vena iugulari ex parte superiori fluxerit sanguis maiori impetu, quam ex inferiori, cum si non daretur sanguinis circuitus, & si eius motus non esset à circumferentia ad centrum, contrarium deberet accidere, cum ex superiori nō possit euacuari sanguis, nisi supeditatus à venis minimis in capite existentibus; In inferiori verò possit emitti prodicens à cervicalibus; quæ cum eum trahant à caua in maxima copia, ita eodem modo potest subministrari, & sic inferior euacuatio nunquam potest

test æquari à superiori; contrarium tamen euenit; ergò in venis sanguis mouetur à circumferentia ad centrum.

Reddat insuper rationem Aduersarius, cur in secunda experientia ligata vena intumesceret ex parte superiori, defecerit prorsus ex inferiori, & ex hac secta nō nisi sanguis emanauerit, vt assolet euacuari retrò aures post amotionem hirudinum, nisi quia motus in venis sit à circumferentia ad centrum. Quod de arterijs pariter obseruatum fuit in tertia, & quarta experientia, in hac enim maiori impetu fluxit.

lan-

sanguis ex inferiori arteria, quam ex superiori, in illa ex superiori parte arteriæ sectæ nihil prorupit, licet incisio bis, & ter peracta fuerit, nisi postquam eam forcipe abscidit.

Ex qua experientia meam rationem adduco, qua de causa ex inferiori parte venæ fluxerit sanguis contra nostrum suppositum, & fluxerit etiam ex superiori parte arteriæ; Cū enim Aduersarius bis, & ter arteriam secuisset, & nihil ex ea emanasset, postmodum forcipe abscissa, fluxisset ī copia sanguis, in eam deveni opinione, id accidisse ratione doloris, atra-

tractionis, vel concussionis; In arterijs enim, cum non dentur Valvulæ, idcirco potest observari fluxus ex parte superiori. Quod autem idem apparuerit in inferiori parte venæ iugularis, dico, id euenisse, quia cū in vena iugulari solū sint valvulæ in eius orificio, vt dixi in prima parte, si fuerit peracta sectio infra valuulam versus Cor, mirum non est, ratione doloris, & concussionis ex parte inferiori venæ fluxisse sanguinem; si enim sectio fiat infra valuulas versus caput, non nisi aliquæ guttæ sanguinis in eadem substantia venæ existētes

tes prorumpunt; quod si tali loco fuerit peracta, & tamen fluxerit sâguis ex inferiori parte venæ, id ex eo accidisse arbitror, quia inter ligaturam, & valuulam potest dari communio venæ exigua, quæ ab arterijs trahat sâguinein, vt vult Vvalæus, siue vt vult Bartholinus, quia inter valuulam, & ligaturam intercedat aliqua anastomasis cum arteria, non enim anastomases in solis extremitatibus obseruâtur vt dictum est, & confirmatur, quia secta vena in cubito infra duas ligaturas emittitur sanguis, qui cum nec ex superioribus, nec

ex

ex inferioribus subministrari possit, aliundè non suppeditatur nisi ab aliqua anastomasi cum arteria infra duas ligaturas existente.

Quod autem observauerit Aduersarius, diuersitatem sanguinis in venis, ita vt ei visus fuerit differre sanguis venæ superioris à sanguine ex vena inferiori, dico, id comprobare, quæ à me allata fuere in respōsione secūda logicæ obiectionis; Si enim obseruetur differentia in sanguine venoso, & hac non possit esse, nisi accidentalis, sequitur, quod mirū non sit, si videatur differre eo-

G. dein

dem modo arteriosus à venoso.

Ad id, quod affirmat, maiorem sâguinis copiam æquo tempore fuisse collectâ ex vena, quam ex arteria, respondeo id potuisse accidere, si amplius fuerit foramē venæ, quam arteriæ, vel si prius secta fuerit vena, quam arteria; huic enim non potest ea solita quantitate suppeditari sanguis à corde, si ipsi cordi eodem modo non subministretur à venis, quæ cū prius euacuatae fuerint, non solum cessat consequenter sanguinis exitus, sed etiam aliquo modo motus cordis, quo cessante,

sante, vel non rectè operante, sanguinis in arterias nō potest fieri perfectō modo influxus.

Uterior habetur comprobatio, motum sanguinis in venis esse à circumferentia ad cētrum, nam cū in inferiori parte venæ procedat sāguis ex lato in angustum, maiori impetu ex hac deberet emanare, quam ex superiori parte venæ, in qua sanguis peruadit ex angusto in latum (quo enim angustius est foramen in tubis aquam sursum ferentibus, eo maior observatur impulsus, & impetus, & quò satius, eò minor) contrarium in prima ex-

G 2 peri-

periclitia fuit ab aduersario obseruatum, fluxisse nimirum maiori copia ex superiori parte, quam ex inferiori; ergo ex illa in hanc motus est sanguinis in venis.

CAPVT QVARTVM ABSVRDA REFELLVNTVR.

Primum absurdum, quod in sententiam nostrā, intorquet Aduersarius, est huiusmodi, fieri nimirum minorem spirituum iacturam ex sectione magnarum venarum, quam ex sectione saluatellæ, seu extremis cucurbitulis affixis Verum respondeo, licet venæ minores rariorem, calidiorēq;

remq; sanguinem contineant, quam maiores, tamen non sequitur, maiorem fieri iacturam spirituum ex sectione minimarum quam maiorum, cum sanguis educatus ex minoribus venis, nunquam æquet sanguinem educatum ex maioribus, præterquàm quod si secetur vena in cubito, ideo fit maior iactura spirituum, quam ex saluatella, quia per eam confluit sanguis, non tam per anastomases manus, quam per anastomases brachij communicatus, & sic quia in maiori copia suppeditatur sanguis, proportionabiliter etiam suppeditatur spiritus;

tus; secus verò accidit in salu-
tella, per quam solum potest
euacuari sâguis per anastoma-
sim manus cômunicatus, neq;
multum de illo potest extrahi
ob venæ exiguitatē; Si verò ac-
cidat, quod ex saphena, vt sæ-
pius expertus sum, in copia ex-
trahatur, sepè lypothimia, &
syncops accidunt.

Aliud absurdum est, falsum
esse veterum illud assertû: Plus
deicit gucta seminis, quam co-
pia sanguinis.

Respondeo, id non sequi
semper ex nostra assertione, nâ
ex eo quod cōtinuò, & copio-
sè agens spiritus pariat, tamen
pro-

prouida natura , cū maior copia spirituum ad semen fecundum reddendum requiratur , quam ad nutritium reddendum sāguinem, ex genitis maiorem copiam demittit ad testes, quam ad sanguinem, proportionabiliter tamen loquendo ; Nam si accidat , quod gutta seminis tantum spiritum contineat , quantum quinque guttæ sanguinis ; Si fiat deiectio sanguinis ad guttas octo , & seminis ad guttam vnam , maior erit spirituum deiectio ex octo guttis sanguinis , quā ex gutta seminis . Ex quo patet, esse reiciendam Aduersa-

rii opinionem existimantis, id esse absurdū à nostra opinione deductum. Admittimus quidē copiosiore spiritum in gucta seminis, quā in gucta sanguinis, non autem copiosiore in gucta seminis, quam in copia sanguinis.

His positis absurdis duo proponit Aduersarius; primū sanguinem in venæ scissione cor petere certum esse, dissonū, quod ab arteria procedat; g; nō nisi per communicationem ab alijs venis.

Cui respondeo induci posse falsitatem ex ipsius principio, nam probauimus in venis dari
valu-

valuulas , per quas transitus
 impeditur à centro ad circum-
 ferentiã, vnde sanguis per ad-
 uersarium , vel eodem modo
 mouetur , vel diuerso modo ;
 si eodem modo ; ergo omnis
 cor petit ; ergo debet submini-
 strari ab arterijs , cum ille , qui
 extrahitur ; nequeat contineri
 in venis brachij , & manus ,
 cum celebratur phlebotomia
 in cubito ; Si diuerso modo , nō
 potest assignari ratio , ratione
 valuularum ; ergo in omnibus
 cor petit .

Neq; verum est , in motu ,
 quem Aduersarius vocat iuuā-
 tem , moueri sanguinem in ar-

G . 5 tertia

teria versus Cor; nam etiam in sententia Antiquorum, ne gutta quidem sanguinis ab aorta in sinistrum Cordis Ventriculum potest remeare, impediētibz Valuulis. Neq; pro motu sanguinis in venis recurrimus, vt vult Aduersarius, ad motum iuuantem, quamuis idem dicat, eum non esse naturalem, cum ab arteria non possit subministrari, cum copiam longè minorem cōtineat, & cum in minori numero sint, quam venæ; Neq; sit violentus, cum non adsit dolor, aut calor, nam motum neq; iuuantem, neq; proprium habere sanguinem

nem per se ostendimus; Esto enim, admittam in timore fieri recursum sanguinis ad Cor per venas, tamen talem motū voco naturalem, cum is motus sit ad Cor, & cum fiat à natura ad tuendam partem Nobilissimam. Quod possit, & debeat suppeditari ab arterijs, iam ostendimus.

Proponit secundum tali pacto. Sanguini venoso, vel addit aliquid Cor, vel non; Si addit, vel est maior puritas, vel maior tenuitas; non puritas, quia purum nō fit, nisi per digestionem rei puræ ab impura, nullum autem membrum ex-

purgans est in corde; Non tenuitas, quia statutum Philosophorum est, vltiori coctione sanguinē crassescere; ergo nihil addit.

Respondeo, vtrumq; prestare Cor sanguini, puritatem nimirum, & tenuitatem, cum sanguis eadem consistentia, & calore non egrediatur ex sinistro, qualis dextrum Cordis ventriculum intrauerat; ex abundantia, & caloris, & spirituum, quibus scatet sanguis ē sinistro emanans, & quibus caret, qui ingreditur dextrum, colligitur diuersitas, & antequam sinistrum ingrediatur, vlt-

ulteriore præparationem ac-
 cipit à pulmonibus; Præterquã
 quod qui dextrum ingreditur,
 est ineptus ad nutritionẽ, aptus
 qui è sinistro emanat, quod
 colligere inde est, nam hepar
 non nutritur sanguine in eo
 genito, siue in eo transcolato,
 sed per arterias alius à corde
 refunditur. Quod autẽm purũ
 non fiat, nisi per digestionem
 rei puræ ab impura, iam con-
 cedo, quod autem in corde
 nullum sit membrum expur-
 gans, nego, cum fuligines de-
 xtri ventriculi per venam ar-
 teriosam euaporent, & vapo-
 res vtriusq; ventriculi per Bar-
 tho-

tholinum, in aquam pericardij densentur, & in pilos subalares euacuentur.

Ad id verò, quod sanguis per vltiorem coctionē crassescat ex Philosophorum sententia, respondeo id verificari, si coctio sit ad modū assationis. Vnde si in corde sanguis moram traheret, eius certè sequeretur adustio, nō perfectio, cum autem continuò recipiatur, & expellatur, moram non trahit, & consequenter non aduritur, neq; dicas esse impossibile, vt momento perficiatur cum flamma clijchnij aliam in ictu oculi accendat.

Quis

Quis sit usus cordis, & quænam eius præstantia his verbis explicatur à Doctissimo, & præstantissimo Io: Forte Cent. 3. conf. 1. : *Omniū bonorum Author, & origo est Cor; Pulsus, & respirationis primus motor; facultatis vitalis domicilium; Vitæ principium; fons natini, & ingenti caloris; Arteriarum, & influentis caloris scaturigo; sanguinis perfectio; Nutricis facultatis officina, & omnium nostrarum operationum Opifex, atq. Magister, quo vigente vigent omnia, languente languescunt, intereunte intereunt.*

CAPVT QVINTVM

RESPONSIONES ADVERSARII
REPROBANTVR.

A Sseruimus sanguinem
in copia recipi in
qualibet Cordis dilatatione, &
expelli in constrictione, ac per
vnicam horam ita attrahi, &
expelli, vt multiplicata copia
arguatur manifestè eiusdè san-
guinis frequens recursus ad
Cor. Contra dicit Aduersarius,
per pulsationem sanguinem
induci in arterias, non sub spe-
cie humoris, sed sub specie va-
poris, & si sub forma humoris
inducatur, non sub forma hu-
moris sinceri, sed magna ex
parte

parte aere turgidineq; continuis pulsationibus, sed aliquibus.

Hæc tamen solutio frustra-
nea est, vt satis elicitur ex ijs,
quæ diximus de motu cordis
Eius enim pulsus nequit effici,
neq; à rarefacta gucta sangui-
nis, neq; ab eius ebullitione, &
consequenter neq; ab eius va-
pore, sed à sanguinis copia.
Vnde eodem modo transmitti
à corde in arterias, sub specie
nimirum humoris, & non sub
specie vaporis affirmo, idq;
quia secta arteria potest breui
temporis spatio euacuari totus
sanguis, vt omnes concedunt
eru-

eruditi professores, & præcipuè Galenus, qui ex secta arteria affirmat spatio semihoræ posse totam sâguinis massam exhauriri. Id rursus confirmatur, quia in venæ sectione, si nimis stricta sit ligatura, neq; pulsus persentiat, neq; gutta sanguinis ex secta vena emanat; compressa siquidē arteria nequit sanguis ratione vacui trāfire in venas, & nequit pulsus effici, cum impediatur sanguinis impulsus; Et si sub specie vaporis venas sanguis ingrederetur in experiētijs ab aduersario administratis, non profluxisset eo impetu, quo
 pro-

profluxisse idem affirmat; g.
signum est, eum sub specie
humoris profluxisse.

Ad suam autem compro-
bandam opinionem, subdit
Aduersarius, hoc argumentū
æqualis systole, & diastole fi-
unt, æquali obiecto, in corpo-
re sano æquales sunt systole, &
Diastole; ergo in corpore sano
est æquale vtriusq; obiectum,
sed singula diastole fit tanta
sanguinis immissio; ergo sin-
gula systole, tanta receptio;
ergo nullus circuitus, cum in
systole nulla fiat receptio, quia
in systole partes sunt in statu
contrario receptionis.

Ref-

Respondeo , distinguendo
 maiorem , æqualis diastolæ , &
 systolæ fiunt æquali obiecto ,
 ita vt vnum se habeat de ante-
 cedenti , & sit in causa , alterum
 de consequenti , & sit effectus ,
 cōcedo maiorem , ita vt vtrūq;
 se habeat eodem modo , nego
 maiorem ; In diastole enim
 præter facultatem ipse sanguis
 est de antecedenti , & est causa
 dilatationis , in systole verò est
 de consequenti , & est effectus ,
 quia in tantum expellitur , in
 quantum constringitur . Si au-
 tem mens Aduersarij sit , vt tã-
 tum expellatur , quantum reci-
 piatur , transeat totum primum
 ar-

argumentum, & nego suppositum subsumptæ, & vtriusque consequentiæ; Nam in diastole non fit immissio, vt vult Columbus, sed fit receptio, & in systole nō fit receptio, sed immissio. Vnde in consequentibus frustrà conatur Aduersarius probare in systole nullam fieri receptionem, cum hæc sit opinio nostra; In hoc autem dissentimus, quia, cum Aduersarius affirmet, nullam fieri receptionem in systole, existimat probare, nunquam fieri, cum supponat cor, & arterias esse eodem tempore in expulsionem, & cum sint in statu contrario

trario receptionis, si fiat sanguinis expulsio, nō recipiatur, & consequenter non fiat; hoc enim falsum est; probauimus namq; diuerso tēpore cor constringi, ac arterias, id enim, quod expellitur à corde, recipitur ab arterijs; Sed esto per aduersarium, fiat eodem tempore constrictio cordis, & arteriarum, videat Vallesium in controuersijs, & obseruabit per cōstrictionem arteriarum non tam fieri expulsionem in alias partes quam receptionē à corde, cum sua etiam caua retineant, & totaliter non obstruantur quod ab omnibus
ad-

admittendum, etiam in sententia nostra, cum Cor non totum expellat, quod continet, ut & arteriæ, & ex hoc patet spiritus, non in instanti introduci, generari, extramitti, sed cum aliqua temporis differentia.

Subdit Aduersarius, cum motus non fiat in instanti, sequitur, si dilatatio fieret à sanguine, in vna parte arteriæ esset systole, in alia diastole.

Respondeo, uti diximus superius, præter copiam sanguinis tali de causa concurrere facultatem dirigentem, quæ æqualiter fit motus in arterijs.

Ex

Ex alia ratione affirmat Aduersarius, non fieri diastolem, & systolem, nisi ut sanguis arteriosus, calor cordis, & partiū temperetur.

Hunc non esse vnum, ostēdi in obiectionum solutione.

Noto hic Aduersarij contradictionem, qui negauit superius, sanguinem induci sub forma humoris, cum hic affirmet, præter attractionem sanguinis halituosioris, fluxum sanguinis continuum à corde esse, ut sit eiusdem spiritus vehiculum, & nutriendi vim etiam obtinere cum venoso in partibus per mixtum, eo fine (proprijs

prijs hic vtor verbis) vt hic excitetur, & se inuicem contemperent.

Vasorū fortitudini, & moræ sanguinis in venis dicatas esse valuulas credit Aduersarius cum Galeno Fabricio, Vesalio. Verum hunc non esse vsum, recentiores omnes affirmant, sed vt sanguinis reditum inhiberent. Oppositum Aduersarius duobus modis ostendit, quia non minus in arterijs, quam in venis sit metuendus regressus. Secundò, quod si comprimatur vena in parte superiori refluat sanguis. Ad hoc iam responsionem dedimus,

mus , & causam assignauimus .
 Ad primum respondeo , non
 esse metuendum regressum sâ-
 guinis in arterijs cum omnes
 præter Carotides deorsum spe-
 ctent, vndè non tantum ratio-
 ne suæ grauitatis difficulter
 sursum mouetur, sed ab impul-
 su à corde communicato , quo
 impulsu in carotidibus sursum
 mouetur, & nequit refluere. In
 venis autem, cum præter iugu-
 lares omnes sursum moueantur;
 necessariae sunt valuulæ, vt im-
 pediant refluxum, quem ratio-
 ne grauitatis posset habere, cū
 non detur ille impulsus , vt in
 arterijs ; Præterquam quod ad
 moram

moram sanguinis valuulas nō esse institutas, indè arguitur, quia lecta vena riuulose, & copiosè sanguis emanat.

Hoc autem confirmat Haruei experimentum; Si enim brachium vinculo constrictū in niuem, seū aquam frigidissimam immergatur, quousq; frigeat, obseruabitur amota aqua, seū niue, & soluta ligatura, statim lædi Cor ex illa refrigeratione, quod signum manifestum, sanguinem moueri motu celeri, & non tardo, & ita nō moueretur, si ad moram eiusdem constructæ fuissent valuulæ, neq; assentien-

H 2 dum

dum opinioni Inuentoris Fabricij, cum nihil sit inuentum, & perfectum, vt ait Cicero.

Experientiæ allatæ de atramento per siphonem immisso in arterias fidem se habere affirmat; Verum dubitat, an licet accidat id in demortuo, contingeret in viuo, cum contrarium demonstrent arteriæ ventriculum subeuntes, quum autem in his non detur circuitus, non est maior ratio, cur detur in alijs; si vero admittatur, debet ostendi rubor, vt dicit Vesalius contra Galenum, cum cōtineant vasa album liquorem.

Ref-

Respondeo, talem motum probari in viuis posse ex venæ sectione, & ex his, quæ diximus cap. 6. ; Si enim exinaniatur vena digito versus manū, & in superiori adigatur altero digito sanguis ad venam inanitā, obseruabitur adhuc inanita, & in superiori nodus, qui indicat valuulam, quæ humoris aditū remoratur; Elsholhi experimenta id confirmant.

Non solum autem in arterijs Ventriculi, sed & Mesenterij admitto circulationem. Ventericulum enim ingrediuntur arteriæ cœliacæ; intestina tenuiora arteriæ mesentericæ,

H 3 Venæ

Venæ etiam in his partibus assignantur meseraicæ. Demonstrantur, etiam(inuentore Afellio) venæ lacteæ. Per arteriam cæliacam, & mesentericam deportatur ex principijs Vvalæi, & Bartholini sanguis ad nutritionem Ventriculi, & Intestinorum; Per venas meseraicas deportatur sanguis superfluus pro nutritione ad hepar; Per venas lacteas detruditur chylus, vel ad hepar, vel ad glandulas thoracicas, idq; colligitur ex ligatura, in qua semper tumida apparet ea pars à qua humor procedit, cuiusq; autem conspicienti mesenterium

rium apparebūt manifestè venæ rubro colore perfusæ, quid quid dicat Vesalius.

Quare omnes conclusiones in opusculo aduersarij dispersæ, manifestè falsificantur.

CAPVT SEXTVM, ET VLTIMVM.

IN calce sui Opusculi posuit Aduersarius Aristotelis, & Hippocratis Testimonia nonnulla, vt demonstraret Philosophorum, ac Medicorū parentibus non probari sanguinis circuitum; Eadem testimonia, vt exponeret ad sensū suum, non nihil detorsit: Vn-

dè muneris nostri partes esse viderentur in aduersarij Commentarium animaduersiones subijcere. Verum, quænam sit mens Philosophiæ, ac Medicinæ Oraculorum, cõstat abundè ex locis, quos attulimus in Proæmio huius Opusculi, & ut liberaliter hic quoq; agamus; Esto, concedat Hippocrates, hepar fontem esse, & officinã sanguinis, an propterea non poterit moueri sanguis in orbem? Nemo tamen miretur, à Nobis secundam Partem opusculi Pauloniani oppugnatam fuisse magis, quam primam, id enim data opera fecimus,

tum

tum vt in Medicinæ tyrocinio
 constitutis Adolescentibus in-
 notesceret sâguinis circulatio,
 firmisq; rationibus comprobe-
 tur; demonstraremq;, eandem
 circulationem non esse rem
 absurdissimam, reiq; medicæ
 perniciosam, vt asserere non
 est veritus Aduersarius, tum
 quia adhuc sub Iudice lis est,
 num sanguis in corde, an verò
 in hepate generetur; Diligen-
 tior enim, & recentior Ana-
 tomes, lactea pancreatica, non
 nisi in receptaculum thoraci-
 cum deferri docet, adeoq; in
 corde sanguinem generari te-
 net, vt videre est inter recen-

H s tissi-

tiffimos Anatomen celeberrimi Molinetti , & Epistolas Thomæ Bartholini ; hoc tamē (licet opinio mea in eo se gerat, vt in corde generetur) indefinitum relinquo vt indulgenter procedam cum Aduersario, quē ijs annumerauerim, qui iurant in verba antiquorū, ac putant, nihil in Physica post Aristotelem , nihil in Medicina post Galenum ultra exquirendum, suamq; scientiam nō mente , sed humeris librant. Immeritò sanè, dum nulla vnquam ætas in eruendis naturæ arcanis nostra hac ditior, & fecundior fuit, in qua, vt ait doctissimi-

Etissimus Bartholinus: *Renouatus homo efflorescit, & suarum operationum est vicinus spectator, & ut cecinit Poeta.*

*Multa dies, variusq; labor mutabilis aevi
Restulit in melius; Non omnia grandior aetas,
Nos, quæ scimus, habet, seris venit usus ab annis.*

F I N I S.





AMICO LECTORI.

I *VXTA* hypothesim in precipuis
Medicinae *Academys* stabilitam
 potuisssem profectò fœlicius pri-
 mam partem *Pauloniana* disser-
 tationis oppugnare, nisi labores
 practici in hac Illustrissima Ci-
 uitate animum aliò diuertissent.
 Sufficiat tamen beneficio Tyro-
 num me utcumque satisfecisse
 secundæ parti, in qua amicè ac
 modestè contra *Paulonium* scri-
 psi si quod autem verbum contra
 eius honorem impudenter mihi
 excidit, indictum volo. Neque
 existimes Amice Lector me ullo
 Pacto erga antiquitatē iniurio-
 sum; cā ego summo opere veneror,
 ac tunc solum deferendam existi-
 mo, quum recentiorum inuentis
vel

*vel placitis, veteres illustrantur
vel corriguntur. Interim scias,
me absente, libellum hunc fuisse
typis mandatum, adeoque mi-
rari non poteris abundare eum
erratis tum typographi, tum au-
thoris. Eorum quæ probè novi
correctionē subyicio. Hac ut no-
rim, boni monitores efficient.
Vale.*

*Narnia Kal. Augusti
1677.*

*Tuus ex animo
Ioannes Baptista Scaramuccia.*

ERRATA GRAVIORA ITA CORRIGES

Pag.	Lin.		Lege
4	5	irreferunt	iusserunt
5	18	eodem	eosdem
8	7	ita fuit	edita fuit
9	6	quadamtesnus	quadamtenus
10	18	am	autem
12	12	ē	esse
15	14	natiuum	natiuam
17	7	symphaticos	lymphaticos
21	13	deretum	decretum
39	18	hepar	ad hepar
42	2	conneſtente	conuertente
45	6	tricuspites	tricuspidēs
46	9	membracula	membranula
49	14	preter	præter
49	16	diſcultyter	difficulyter
50	9	in illis	in illas
50	13	meſſentericis	meſentericis
50	17	nummerus	numerus
51	12	num	nam
51	4	preter	præter
52	9	vanis.	venis
53	5	ta meſieri	tumeſieri
53	10	ceteris	cæteris
54	17	.g.	ergo
56	9	ē	eſt
57	3	moſi	motu
57	8	preter	præter
58	15	.g.	ergo
60	9	appateret	appareret
62	7	quum	

62	7	quam	quam
62	12	remoratum	remoratur
63	14	suppeditatus	suppeditetur
65	15	eni	enim
66	13	sympatricè	sympathicè
67	7	preter	præter
68	4	vesficulam	vesiculam
68	8	sanguineis	sanguine
69	7	protraderetur	protruderetur
71	4	sanguis	sanguinis
71	10	bracchi	brachij
72	17	conualuit	conualucrit
73	1	deiuist	deiecit
73	3	extinctus	extinctus
73	10	balzamicum	balsamicum
73	13	scorbutam	scorbutum
76	3	coluntur	solluntur
76	9	fetus	fatus
77	9	fetum	fatum
78	14	nummerosa	numerosa
78	15	flaminam	flaminum
79	8	perefiguam	perexiguam
79	15	durum	duram
79	16	varis	vasis
81	10	numero	numero
83	6	reto mirabile	retemirabile
85	2	ne pones	ne posset
86	18	remeat	remeet
87	17	hypograftico	hypogastrico
88	3	genitum	expurgatum
88	4	celiacam	cæliaca
88	17	fetū	fatu
89	2	ymbeliculis	ymbelicalis

89	8	ad hepar	ad hepar
89	9	placentum	placentam
89	11	disseminantur	disseminantur
90	3	num	nam
91	1	arteriarum	arteriosam
92	16	cadat	cedat
93	4	autoribus	Auctoribus
93	17	necesse est quod	necesse est quod
94	4	attractice	attractrice
94	9	attracticem :	attractricem
94	12	rectos	rectos
95	3	que	que
95	8	tenuioribus	tenuioribus
97	13	propugnemus	propugnemus
98	16	formicare	formicari
101	15	quedam	quedam
102	12	Cramphus	Cramphus
103	6	versimile	versimile
107	1	Auctoribus	Auctoribus
107	17	gutta	gutta
109	11	transitum	transitum
109	13	nullum	nullam
110	18	detumescent	detumescent
111	8	per ipsam	per ipsam
113	3	deferendum	deferendum
113	13	dilatari	dilatari
119	3	maiores, ac minores	maiores, ac minores
120	3	Patrum	Patrum
120	7	de hac re	de hac re
123	15	ostendis	ostendis
124	2	venis	venis
130	7	scindetur	scindatur
			135 6 san-

135	6	sanguis	sanguineus
136	11	hiruadinum	hirudinum
137	17	medico	modico
139	15	inconceßum	inconcußum
141	8	intumesceret	intumueris
147	17	fatius	latius
147	17	inPetus	impetus
147	18	grima	prima
153	11	celebratur	celebretur
162	8	persentiatnr	persentitur
168	6	vnum	vsum


Alijs in locis sepißime inuenies ē pro est, .g.
 pro ergo, preter pro præter, fetu pro foetu,
 & similia, quæ omnia tibi (humanissime
 Lector) consideranda, & corrigenda super-
 sunt.



135	6	sanguis	sanguineus
136	11	hiruadinum	hirudinum
137	17	medico	medico
139	15	inconceßum	inconcußum
141	8	intumesceret	intumueris
147	17	fatius	latius
147	17	inPetus	impetus
147	18	grima	prima
153	11	celebratur	celebretur
162	8	persentiatur	persentitur
168	6	vnum	vsum

Alijs in locis sepißime inuenies ē pro est, .g.
 pro ergo, preter pro præter, fetu pro foetu,
 & similia, quæ omnia tibi (humanissime
 Lector) consideranda, & corrigenda super-
 sunt.





610

BIBLIOTECA